

フマキラー

防疫用殺虫剤

第2類医薬品

フマキラー[®]

ゴキブリ用スミチオンMC[®] (マイクロカプセル剤)

スミチオンは住友化学㈱の登録商標です。

〔販売名〕 フマキラーゴキブリ用スミチオンMC

〔効能・効果〕 ゴキブリ、マダニの駆除

〔有効成分〕 フェニトロチオン……………20%

〔その他の成分〕 ポリウレタン系樹脂、アラビゴム末、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、キサンタンガム、1,2-ベンズイソチアゾリン-3-オン、ジプロピレングリコール、水

〔用法・用量〕 目的に応じて水で希釈し、一般に害虫の生息又は発生場所に対して使用してください。

●ゴキブリ、マダニ：1mlにつき40～80倍液50mLの割合で重点的にゴキブリ、マダニの潜む場所あるいはよくはいれる場所に残留塗布又は噴霧してください。

内容量: 4kg

〔製造販売元〕

フマキラー株式会社

〒739-0494 広島県廿日市市梅原1-11-13

〔本社所在地〕

〒101-8606 東京都千代田区神田美倉町11

お客様相談室 ☎ 0077-788-555

☎ 03-3255-6400

スマホエ オモテラベル ①

〔保管および取り扱い上の注意〕

(1) 使用に際しての注意

● 使用前に必ずラベルをよく読み、薬剤の性質、使用方法、注意事項を熟知してから作業を開始すること。使用上の注意事項を厳守すること。

● 定められた効能または効果に従い、用法および用量を厳守して使用すること。間違った使い方をすると、効力不足や健康を害することがあります。● 環境を汚染しないために乱用を避けること。また、養殖池、井戸、地下水などを汚染するおそれのある場所、蜜蜂、蚕(桑)、水棲生物などに被害を及ぼすおそれのある場所では使用しないこと。● 使用に際しては、必要量だけ分取し、その都度使い切ること。アルカリ性の下では分解しやすいので石けん水等の混入を防ぐこと。● 希釈した液は沈殿し分離することがあるので、使用時には攪拌し、また、直射日光の下に放置しないこと。

● 本剤と他の薬剤とを混合したり、加熱したりしないこと。● 病人、特異体質者、妊婦、乳幼児などは、薬剤の影響のない場所に移動させること。● 次の方は取り扱わないようにすること。-じんましん、かぶれ、気管支ぜんそく、偏頭痛などを起しやすい体质の方。-過去に塗料、洗剤、薬などによるアレルギー症(発疹、かゆみなどを)に経験した方。-体の調子の悪い方や睡眠不足の方。● 食品、食器、飼料、おもちゃ、寝具、衣類、愛玩動物、観賞魚、植物、貴重品、美術品、楽器、電気製品などはあらかじめ他へ移すか、あるいは格納し、薬剤がかかるないようにすること。

(2) 使用中や使用後の注意

● プラスチック、ゴム、塗装面、コンクリート、石材、白木、壁紙などを変形、変色させる場合があります。変形、変色させてはならない建築物、内装・外装材、建具、家具などには覆いをする等の処置をし、薬剤がかからないようにすること。一、薬剤がかかった場合はすぐにふき取ること。水道や下水等の配管などにかかった場合はすぐに洗うこと。また、濃厚希釈液の場合は、植物にかかった場合は枯れることがあるので注意すること。● 本剤は、皮膚につくとかぶれたり、また目や呼吸器の粘膜を刺激することがあるので、使用に際しては、長袖の作業衣、作業帽、保護メガネ、有機溶剤用防毒マスク、保護靴、ゴム手袋などの保護具を必ず着用し、身体の露出部を少なくして、薬剤を浴びないようにすること

★ラベルをよく読む。

★記載以外には使用しない。

★小児の手の届く所には置かない。

注意—人体に使用しないこと

■ 使用上の注意 ■

〔してはいけないこと〕

● 薬剤を口や目に入れないこと。● 希釈するときは、水がはね返らないようにして均一に攪拌し、手や指で直接かき混ぜるようなことはしないこと。小分けしたり希釈する容器は専用のものとし、他と兼用しないこと。

〔相談すること〕

● 万一、誤って薬剤を飲み込んだ場合は、吐かせずに直ちに医師の診察を受けること。● 薬剤の使用により頭痛、目や喉の痛み、咳、めまい、吐気、気分が悪くなった場合などには、直ちに使用を中止し、清潔な空気の場所で安静にして、医師の診察を受けること。● 医師の診察を受ける際には、本剤が有機リン系の殺虫剤であること、および使用薬剤の名称、成分名、症状、被曝状況について出来るだけ詳細に医師へ告げること。

裏面ラベルもよく読んでお使いください。

ともに、できるだけ吸い込まないように注意すること。● 薬剤が皮膚に付いたときは、直ちに石けん水でよく洗うこと。作業中に大量の薬剤を浴びた場合には、直ちに汚染した衣類を脱ぎ、石けん水でよく洗うなどして体に付着した薬剤を洗い落とし、清潔な衣類に着替えること。いずれの場合も、医師の診療を受けること。● 長時間奥いをかぐと、頭痛、めまい、吐気などを起こすことがあるので、通気の悪い場所での作業では、充分換気するよう配慮し、処理後は必ず充分換気すること。● 使用後は、必ず手を以て、顔や手などの皮膚の露出部分を石けん水でよく洗うこと。● 薬剤処理に用いた機械器具類は石けん水でよく洗い、手入れすること。● 使用済の空容器などは、石けん水でよく洗い、小児が触れないようにするとともに、他に転用しないこと。汚染した器具や洗浄液は、作業現場から持ち帰り、処分に当たっては、自治体の条例や指導に従って処分すること。決して、河川、湖沼、下水道などの水系や地下水を汚染するおそれのある場所には、捨てないこと。

(3) 保管上の注意

● 使用後に残った薬剤原液は、ラベル表示のある元の容器に密封し、食品、食器、容器、飼料など他のものと区別して保管すること。● 小児の手の届かない場所に保管すること。● 直射日光の当たらない乾燥した涼しい場所に保管すること。● -5℃以下では凍る場合があるので注意すること。凍結のおそれがある場所では保管しないこと。● 盜難、紛失などの事故を防ぐ為に、なるべく倉庫に施錠して保管すること。

〔その他の注意〕

● 漏洩した場合には次のように処置すること。- 薬剤が漏洩した場合は、吸収性的媒体、例えば砂、軽石、布、オガワズなどに吸着させ、広がりを阻止して回収すること。- 漏洩した薬剤が井戸、池、河川などの水系に流入した場合は、直ちに警察または保健所に届け出ること。● 火災事故の場合は、薬剤が燃焼すると有害なガスが発生するおそれがあるので、人を避難させること。

裏面ラベルもよく読んでお使いください。

スマホエ ウララベル ①