

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

漢方製剤

葛根湯

葛根湯エキス顆粒「至聖」

葛根湯エキス顆粒「至聖」は、漢方薬の代表的処方「葛根湯」を飲みやすくしたエキス顆粒剤です。かぜのひき初め、頭痛、鼻かぜ、寒気がしてぞくぞくするときに服用していただく効果があり、眠くなることもありません。また、肩こり、筋肉痛、パソコンやワープロなどの疲労からくる手や肩の痛みを和らげます。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、 筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、 全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
* 多 形 紅 斑	皮膚が広い範囲で赤くなる。水疱が皮膚の赤い部分にあらわれ る。高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

裏面の効能・効果、用法・用量、保管及び取扱い上の注意も必ずお読みください。

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：
感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】

下記の量を食前または食間にそのまま水かお湯で服用する。またはお湯を加えてかき混ぜて溶かし、温かいうちに服用する。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	1 包	3 回
7 才以上15才未滿	2/3 包	
4 才以上 7 才未滿	1/2 包	
4 才未滿	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

<用法・用量に関連する注意>

- 1. 4才以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 2. 用法・用量を厳守すること。
- 3. 溶かして服用するときは、熱湯を加えスプーンなどでかき混ぜて溶かし、早めに服用すること。服用した後に、溶け残りがある場合には、熱湯を加えてかき混ぜて溶かし、残らず服用すること。

【成分・分量】

1日量3包（1包3.0g）中

葛根湯エキス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5.0g		
（カッコン.....8 g	マオウ.....4 g	ショウキョウ...1 g
タイソウ.....4 g	ケイヒ.....3 g	シャクヤク.....3 g
カンゾウ.....2 g	より製した乾燥エキス	

添加物：白糖、乳糖、D-マンニトール、ショ糖脂肪酸エステルを含有

【保管及び取扱い上の注意】

- 1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 2. 小児の手の届かない所に保管すること。
- 3. 他の容器に入れ替えないこと。
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- 4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用すること。



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いします。
北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55
電話番号076-472-1011 受付時間9：00～16：30（土、日、祝日を除く）