

第2類医薬品

漢方製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

# 食欲低下 食後の

販売名 香砂六君子湯エキス細粒G「コタロー」

商品番号

Q111

最近、食欲がわかなくなってきた。胃腸が弱くなってきたと感じる。胃がもたれる。そのような時に用いられるのがこのお薬です。

胃腸の調子が悪く、食べると胃腸のトラブルを起こす方に効果があります。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位（消化不良、胃痛、嘔吐に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

体力中等度以下で、気分が沈みがちで頭が重く、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえて疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：

胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

## 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。  
食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15歳以上）	1 包	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【成分・分量】

成分・分量 本剤3包（6.0g）中					
ニンジン	3.2g	チンピ	1.6g	カンゾウ	0.8g
ビャクジュツ	3.2g	コウブシ	1.6g	シュクシャ	1.6g
ブクリョウ	3.2g	タイソウ	1.6g	カッコウ	1.6g
ハンゲ	3.2g	ショウキョウ	0.4g		

より抽出した水製エキス4.70gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (7)箱の「開封年月日」記入欄に、箱を開封した日付を記入してください。



本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/>  
フリーダイヤル0120(149)931

製造販売元 **小太郎漢方製薬株式会社**  
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号