

指定医薬部外品

販売名：リゲイン3000

リゲイン相談ダイヤル 0120-488024

使用に際しては説明書きをよく読むこと。 100mL

■1本(100mL)中の成分■ タウリン 3000mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン(リパオール) 30mg、ベンフォチアミン(ビオタミン：ビタミンB1誘導体) 10mg、ビタミンB2リン酸エステル 5mg、ビタミンB6 10mg、ニコチン酸アミド 20mg、

イノシトール 150mg、無水カフェイン 50mg

●添加物：白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、マクロゴール、カラメル、クエン酸、DL-リンゴ酸、クエン酸Na、

メタリン酸Na、香料、グリセリン、パニリン、エチルパニリン、プロピレングリコール (アルコール0.1mL以下)

●本製品に配合されているビタミンB2リン酸エステルにより、尿が黄色になることがある。

■効能・効果■ 肉体疲労・発熱性消耗性疾患・病中病後・栄養障害・食欲不振・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質

使用期限

製造番号

02 ㊞登録商標

リゲイン[㊞]

タウリン3000mg配合

Regain[㊞]

〔特納用〕



Daiichi-Sankyo

ビンは割れものですので、お取扱いにご注意下さい。

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造

田村薬品工業株式会社

販売元

奈良県御所市西寺田50

■用法・用量■ 成人(15歳以上) 1日1回1本(100mL)を服用する。

●用法・用量を守ること。

(他のビタミン等を含有する製品[㊞]を同時に使用する場合には過剰摂取等にご注意すること)

使用上の注意

相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。1. 服用後、皮ふに発疹、消化器に胃部不快感、下痢の症状があらわれた場合
2. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合

■保管及び取扱い上の注意■ 1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。2. 小児の手の届かない所に保管すること。 ガラス：瓶 金属：キャップ