

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

頭痛・生理痛

第2類医薬品

解熱鎮痛薬

ケロリン[®]A錠

【特徴】◆**ケロリン[®]A錠**は、頭痛・生理痛・歯痛・神経痛などの痛みや発熱にすぐれた効果を発揮する、胃にやさしい解熱鎮痛薬です。

◆眠くなる成分を含まず、小型でのみやすい錠剤のため携帯にも便利です。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15才未満の小児。
- (4) 出産予定日12週以内の妊婦。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 服用前後は飲酒しないでください 4. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹痛、下痢、血便
精神神経系	めまい
その他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲 の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
アレルギー反応に伴う 急性冠症候群*	しめ付けられるような胸の痛み、息苦しさ、胸を強く押さえつけら れた感じ、あごの痛み、左腕の痛み、さむけ、ふらつき、発汗、発 熱、意識の低下、口唇周囲のはれ、かゆみ、じんましん、発疹、の どのかゆみ、動悸等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、 全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労 感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この文書を持って医
師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能又は効果

- 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打
撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

用法及び用量

1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2錠	2回
15才未満	服用しないこと	

（PTPシートの取り出し図）



<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 本剤は、定められた用法及び用量を厳守してください。
- (2) 錠剤の取出し方：右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押
して裏面のグラシン紙を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込
んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

成分及び分量 1日量（4錠中）

アセチルサリチル酸……………1200mg 無水カフェイン……………100mg
ケイヒ末……………100mg 乾燥水酸化アルミニウムゲル……………200mg
添加物として、カルボキシメチルセルロース、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。
富山めぐみ製薬株式会社 お客様相談窓口 ☎076 (421) 5531
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）