

*:2026年8月
(使用上の注意改訂)

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

お湯に溶かして服用
体力中等度以上の方の ひきはじめのかぜ・肩こりに

第2類医薬品

漢方製剤

カッコン湯エキス顆粒S

特納用

カッコン湯エキス顆粒Sの特徴

1. 漢方処方の「葛根湯」のエキス製剤で、味・香りがよく、お湯に溶かして服用できます。
2. かぜにかかり、ぞくぞくする寒気がし、首筋や肩がこわばって、汗がでないような症状に効果があります。
3. 鼻かぜや頭痛に効果があります。
4. 肩こり、筋肉痛、手や肩の痛みをやわらげます。

【カッコン湯エキス顆粒Sはこんな時に】



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸の弱い人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人
 - むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人
 - 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
* 多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

3. 1カ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能・効 果

体力中等度以上のものの次の諸症

感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用 法・用 量

次の量を服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1 包	3 回 食前又は食間にお湯に溶かして服用してください。または、そのまま水かお湯で服用してください。
7 歳以上15歳未満	2/3包	
4 歳以上 7 歳未満	1/2包	
4 歳 未 満	服用しないでください。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 4歳以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分・分 量

本剤は、淡褐色～褐色の顆粒で、3包（1包3.0g）中に次の成分を含有しています。

葛根湯エキス（7/10量）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3.00g

カクコン・・・・・・・・2.82g	ケイヒ・・・・・・・・1.41g
マオウ・・・・・・・・2.12g	シャクヤク・・・・・・・・1.41g
ショウキョウ・・・・0.71g	カンゾウ・・・・・・・・1.41g
タイソウ・・・・・・・・2.12g	

より製した水製乾燥エキス


添加物：D-マンニトール、白糖、乳糖、ショ糖脂肪酸エステル

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 0120-337-336

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

北日本製薬株式会社

富山県中新川郡上市町若杉55