

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。



止 瀉 薬 イヅミ糖衣正露丸

第2類医薬品

下痢を起こす原因は、一般的に食べすぎ、消化の悪い食物や脂肪分の摂り過ぎ、アレルギー性食品（卵・牛乳など）による消化不良、細菌性の食中毒、寝冷えなどによる急性の下痢と、胃腸の働きが不十分なことによる慢性の下痢が考えられます。

胃腸の働きが弱ると腹痛や下痢を起こし易くなり、栄養が十分に吸収されず、体調が悪くすれがちになります。

「イヅミ糖衣正露丸」は、日頃から起こりがちな食べすぎや消化不良などによる下痢、食あたりなどに効果を発揮する家庭常備薬であります。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなる）

- 5歳未満の乳幼児には服用させないで下さい。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
- (3) 高齢者。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

便秘、下痢

- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

◇効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

◇用法・用量

次の量を1日3回食後、湯又は水にて服用する。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 大人（15歳以上） | 3 粒 | 3 回 |
| 8歳以上15歳未満 | 2 粒 | |
| 5歳以上8歳未満 | 1 粒 | |
| 5 歳 未 満 | 服用しないこと | |

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

◇成分・分量

9粒（大人の1日服用量）中、次の成分を含有する。

| 成 分 | 9粒中 | 作 用 |
|--------------|-------|---------|
| 日本薬局方ホクレオソート | 300mg | 殺菌作用 |
| 日本薬局方オウバク末 | 100mg | 健胃作用 |
| 日本薬局方カンゾウ末 | 150mg | 鎮痛・鎮痙作用 |
| チンピ末 | 300mg | 健胃作用 |

添加物として炭酸水素Na、小麦粉、β-シクロデキストリンを含有する。この他に糖衣層として、寒梅炭、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、アラビアゴム末、白糖、メチルセルロース、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有する。

◇保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 本剤は、白色の糖衣を施した丸剤であります。まれにツヤがなくなったり、変色する事がありますが、服用にはなんら問題はありません。
- (5) ビンの中のとめ物は、輸送中に丸剤が破損するのを防ぐためのもので、開封後は不要となりますので、取り除いて下さい。
- (6) 使用期限をすぎたものは服用しないこと。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

和泉薬品工業株式会社 お客様相談室

〒594-0053 大阪府和泉市芦部町181番地

電 話：0725-41-0515

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

【副作用被害救済制度】電話：0120-149-931