

飲み方に改良。  
1錠の赤色を  
少し変えて、  
小型化しまし  
たが効き目は  
同じです。

## 【効能】貧血

【飲み方】成人(15歳以上)、1日

1回1錠、食後に飲んで下さい。

朝晩晚いつ飲んでも構いません。

【特長】

1.体に吸収されやすい鉄分10mgを新配合し、クラッとする貧血を治します。

2.貧血が原因の疲れだるさを治します。

3.錠剤を小型化し、飲み方に1日1錠に改良しましたので、続けて飲みやすくなりました。

4.1週間の服用で貧血に効き始めます。

5.めまい・朝の起きづらさ・お嬢様の貧血・産前産後の貧血を治します。

6.鳥レバー111gまたはホウレン草500g中に含まれる鉄分と同量の鉄分10mgを1錠中に配合しています。

7.鉄分の吸収を高めるレモン約3個分のビタミンC、赤血球を守るビタミンE、赤血球を造るビタミンB<sub>12</sub>、葉酸を配合。

8.携帯しやすい14日分アルミニウム包装、お子様用マスチゲン錠を新たに品揃えしました。

【飲み方に連絡する注意】(1)貧血症状が少しでも改善された方は、その後も根気よく服用して下さい。詳しく述べは、薬剤師・登録販売者にご相談下さい。(2)本剤の服用前30分は、玉露・煎茶・コーヒー・紅茶は飲まないで下さい。ほうじ茶・番茶・ウーロン茶・玄米茶・麦茶はさしつかえありません。(3)2週間ほど服用されても症状が改善しない場合、他に原因があるか、他の疾患が考えられます。服用を中止し、医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。

## 【成 分】1錠中

溶性ピロリン酸第二鉄 ..... 79.5mg  
(鉄として10mg)

ビタミンC ..... 50mg

ビタミンE酢酸エステル ..... 10mg

ビタミンB<sub>12</sub> ..... 50μg

葉酸 ..... 1mg

添加物：ラウリン酸ソリビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリル脂肪酸エチル、二酸化ケイ素、セルロース、乳糖、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルメチロース、ステアリン酸マニトウム、クロスボビドン、ヒドロキシフルオロース、ステアリン酸トリエチル、ヒドロメチロース、酸化チタン、マクロゴール、カルナバワックス、赤色102号

## 【成分に関する注意】

配合されている溶性ピロリン酸第二鉄により便秘になつたり便が黒くなることがあります。

## 使用期限

## 製造番号

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない温湿度の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。(2)児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。誤用の原因になつた品質が変わることがあります。(4)錠剤の色が落ちることがありますので、濡れた手で錠剤を触らないで下さい。手に触れた錠剤は、容器に戻さないで下さい。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。(6)容器内に乾燥剤が入っています。誤って服用しないで下さい。

## 開け口

# クラッとする 貧血 に マスチゲン錠

MASTIGEN® TABLET



飲み方は1日1錠

## 吸収のよい

# 鉄分

鉄の吸収を高める

## ビタミンC

赤血球を守る

## ビタミンE

第2類医薬品

## 【使用上の注意】

**してはいけないこと** 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起きやすくなります。本剤を服用している間は、他の貧血用薬を服用しないで下さい。

**相談すること** (1)次の人は服用前に医師・薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師・薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 関係部位  | 症 状                  |
| 皮 ふ   | 発疹・発赤・かゆみ            |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐・食欲不振・胃部不快感、腹痛 |

3.服用後、便秘、下痢があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師・薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4.2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師・薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

製造販売元  
**日本臓器製薬株式会社**  
大阪市中央区平野町4丁目2番3号  
お客様相談窓口 ☎ 06-6222-0441  
土・日・祝日を除く 9:00~17:00  
副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

飲み方を厳守して下さい。  
服用前にこの  
錠剤の説明文書  
をお読み下  
さい。  
医薬品にて  
請ひ、服用  
前に必ず  
お読み下  
さい。

# クラッとする貧血に マスチゲン錠

アルミパウチ包装

切り口

飲み方は1日1錠

切り口

第2類医薬品 貧血用薬



開封後は、矢印の先のチャックを押さえて閉めて下さい

## 【効能】貧血

【飲み方】成人(15歳以上)、**1日1回1錠**、食後に飲んで下さい。朝晩いつ飲んでも構いません。

## 【特長】

- 1.体に吸収されやすい鉄分10mgを新配合し、クラッとする貧血を治します。
- 2.貧血が原因の疲れ・だるさを治します。
- 3.錠剤を小型化し、飲み方を1日1錠に改良しましたので、続けて飲みやすくなりました。
- 4.1週間の服用で貧血に効き始めます。
- 5.めまい・朝の起きづらさ・お嬢様の貧血・産前産後の貧血を治します。
- 6.烏レバー111gまたはホウレン草500g中に含まれる鉄分と同量の鉄分10mgを1錠中に配合しています。
- 7.鉄分の吸収を高めるレモン約3個分のビタミンC、赤血球を守るビタミンE、赤血球を造るビタミンB<sub>12</sub>・葉酸を配合。
- 8.携帯しやすい14日分アルミパウチ包装・お子様用マスチゲン錠を新たに品揃えしました。

【飲み方に関する注意】(1)貧血症状が少しでも改善された方は、その後も根気よく服用して下さい。詳しくは、薬剤師・登録販売者にご相談下さい。(2)本剤の服用前後30分は、玉露・煎茶・コーヒー・紅茶は飲まないで下さい。ほうじ茶・番茶・ウーロン茶・玄米茶・麦茶はさしつかえありません。(3)2週間ほど服用されても症状が改善しない場合、他に原因があるか、他の疾患が考えられます。服用を中止し、医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。

## 【成分】1錠中

溶性ピロリン酸第二鉄 79.5mg(鉄として10mg)  
ビタミンC 50mg ビタミンE酢酸エステル 10mgビタミンB<sub>12</sub> 50μg 葉酸 1mg  
添加物: ラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、二酸化ケイ素、セルロース、乳糖、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、クロスボビドン、ヒプロメロースフル酸エステル、クエン酸トリエチル、ヒプロメロース、醸化チタン、マクロゴール、カルナウバロウ、赤色102号

## 【成分に関する注意】

配合されている溶性ピロリン酸第二鉄により便祕になります。便が黒くなることがあります。

## 【使用上の注意】

【してはいけないこと】守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起きやすくなります。本剤を服用している間は、他の貧血用薬を服用しないで下さい。

## 【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位  | 症 状                  |
|-------|----------------------|
| 皮 脊   | 発疹・発赤、かゆみ            |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛 |

3. 服用後、便祕、下痢があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【保管及び取り扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼気の少ない涼しい所にチャックを開いて保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。誤用の原因になり品質が変わることがあります。(4)錠剤の色が落ちることがありますので、濡れた手で錠剤を触らないで下さい。手に触れた錠剤は、容器に辰さないで下さい。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。(6)パウチ内に乾燥剤が入っています。誤って服用しないで下さい。

## 【使用期限】

## 【製造番号】

ご使用に際して、この袋の説明文書をお読み下さい。  
必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

飲み方を厳守して下さい。

製造販売元 日本臓器製薬株式会社

大阪市中央区平野町4丁目2番3号

お客様相談窓口 ☎ 06-6222-0441

土・日・祝日を除く 9:00~17:00

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

®登録商標