

シオノギ[®]葛根湯エキス顆粒



使用上の注意 ……

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどをおこしたことがある人
- (8) 次の症状のある人
- むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人
- 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
* 多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

…… 効能・効果 ……

体力中等度以上のものの次の諸症：
感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

…… 用法・用量 ……

次の量を1日3回食前または食間に、水またはぬるま湯でおのみください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15 才以上）	1 包	3 回
7 才以上 15 才未満	2/3 包	
4 才以上 7 才未満	1/2 包	
2 才以上 4 才未満	1/3 包	
2 才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

…… 成分・分量 ……


シオノギ葛根湯エキス顆粒は、淡褐色～褐色の分包顆粒剤で、3包（2.0g×3・成人1日量）中に次の成分を含有しています。

成 分				含量（3包中）	
葛根湯エキス (3/4量)	{	カッコン……………	6.0g	シャクヤク…………… 2.25g カンゾウ…………… 1.5g ショウキョウ…………… 0.75g より得たエキス	3600mg
		マオウ……………	3.0g		
		タイソウ……………	3.0g		
		ケイヒ……………	2.25g		

添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、乳糖水和物、含水二酸化ケイ素を含有しています。

…… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



…… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。 シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」 電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450 受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）	「副作用被害救済制度」について （独）医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）
---	--

®：登録商標