

販売名:シーエーアップ 指定医薬部外品

服用に際しては、表示事項をよく読むこと。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、胃痛、食欲不振

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢、便秘
- 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

次の場合の骨歯の発育促進:虚弱体質、腺病質^{注)}。
妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止。

^{注)}「腺病質」とは貧血などになりやすい虚弱・無力体質を指します。

シーエーアップはゼリア新薬工業株式の登録商標です。

製造販売元



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎03-3527-3690

受付9:00～17:50(土・日・祝日を除く)



ゼリア新薬

Calcium

シーエーアップ® グレープフルーツ風味

指定医薬部外品

500mL

用法・用量

次の1回量を1日1～2回服用する。

年令	1回量
成人(15才以上)	20mL
11才以上15才未満	15mL
7才以上11才未満	10mL
3才以上 7才未満	5mL
1才以上 3才未満	2.5mL
1才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を守ること(他のカルシウムを含有する製品を同時に使用する場合には、過剰摂取等に注意すること。)
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分分量

40mL(成人1日量)中
グルコン酸カルシウム水和物……………3000mg
(カルシウムイオンとして268.1mg)

添加物:クエン酸水和物、D-ソルビトール、塩化Na、安息香酸、リボフラビンリン酸エステルNa、プロピレングリコール、pH調整剤2成分、香料

開栓時に
記入して
ください。

開栓年月日

品質保持の点から、開栓後速やかに
服用すること

開栓後要冷蔵

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)服用のつどフタをよくしめること。
- (5)雑菌などの汚染のおそれがあるので、ビン口に直接口をつけて服用したり、計量コップに入れた薬液をビンにもどさないこと。
- (6)開栓後、味、臭いに変化があり異常を感じた場合は直ちに服用を中止すること。
- (7)ビン口、計量コップは常に清潔に保つこと。
- (8)ビン口、キャップに白い結晶が現れたり、白い沈殿が生じることがありますが、これは内容成分のカルシウムの結晶です。
- (9)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

製造番号 使用期限(年、月)



キャップ 中栓
フィルム 計量コップ ガラス:ビン