

押して開ける▶

△使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと　　生後3ヵ月未満の乳児

👨‍⚕️相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
(4) 胃腸の弱い人
(5) 発汗傾向の著しい人
(6) 高齢者
(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　　状
皮　　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

葛根湯

葛根湯

第2類医薬品

生薬量最大の25g処方

抽出して得られた乾燥エキスを全量配合した顆粒剤

【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。

【お客様相談室】 ☎06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】 株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-1 2

第2類医薬品

セルフメディケーション
税控除対象

葛根湯

葛根湯

第2類医薬品

生薬量25gの満量処方

満量処方

すぐ溶ける

顆粒タイプ

体力中等度以上のものの次の諸症
感冒の初期（汗をかいていないもの）、
鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、
手や肩の痛みに

漢方製剤
第2類医薬品

この箱は本剤とともに保管し、
服用の際にはよくお読みください。

【販売名】 葛根湯エキス顆粒SK

【効能・効果】
体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】 1日3回食前又は食間に服用してください。

年　　齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上　15歳未満	2／3包	
4歳以上　　7歳未満	1／2包	
2歳以上　　4歳未満	1／3包	
2歳未満	1／4包	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。
※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>
(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】
成人1日量3包(1包2.0g) 中 日局 葛根湯エキス 4.34g

成　　分	分　　量	成　　分	分　　量
日局 カッコン	8g	日局 シャクヤク	3g
日局 マオウ	4g	日局 カンゾウ	2g
日局 タイソウ	4g	日局 ショウキョウ	1g
日局 ケイヒ	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物（生薬）のエキスをういていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

製造番号

使用期限

4 987076 628344

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

紙箱 袋：PE、金属

S2