

急性鼻炎・アレルギー性鼻炎に 第②類医薬品

プラタギン®鼻炎錠

本剤は、鼻炎の症状であるくしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目などの症状を効果的に抑える薬剤を配合した錠剤で、これらの不快な症状をすばやく改善します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状のある人。前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。高熱、むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。緑内障、腎臓病
- (9) モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合には副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
急性汎発性 発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

□のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

4. 5～6日間服用しても症状がよくなりません場合には服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

用法・用量

1日3回、毎食後に次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量
15才以上	2錠
7才～15才未満	1錠

（錠剤の取り出し図）



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を必ず守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)錠剤の取り出し方
上図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

成分と働き

1日量（6錠）中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量	働 き
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	くしゃみ・鼻みず・鼻づまりなどアレルギー症状を抑えます。
ブソイドエフェドリン塩酸塩	180mg	鼻の粘膜の充血やはれを抑え、鼻づまりを改善します。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	鼻汁の分泌を抑え、鼻みず、なみだ目を緩和します。
グリチルリチン酸	200mg	炎症を抑え、のどの痛みなどを緩和します。
無水カフェイン	150mg	鼻炎による頭の重い感じをしずめます。

添加物として、CMC-Ca、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、結晶セルロース、ラウリル硫酸Naを含んでいます。


服用時のアドバイス

- 1.鼻炎も他の病気と同じように早めに手当をすることが大切です。
こじらせると治りにくくしてしまいます。
- 2.鼻炎は他の病気と比べて軽くみられがちですが、症状の激しい時は安静にしていることが大切です。
- 3.鼻炎はアレルギー性の場合もありますが、普段から体を鍛え健康に気をつければ、かぜにかかりにくく鼻炎を起こすことも少なくなります。
- 4.疲労や睡眠不足のないようにし、バランスのとれた食事を心がけてください。



保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



お問い合わせ先

本剤の服用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9:00～17:00（祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。



製造販売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18
<https://www.sampo-seiyaku.co.jp/>