ここからお切りください。

開封後はチャックを閉めて保存してください。

第2類医薬品 漢方製剤

幸輝防已黄耆湯

こうきぼういおうぎとう

84錠
(7日分)

日本生薬漢方

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）

用法・用量

次の量を1日3回 食前又は食間に水又は白湯で服用して下さい

年　齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

【保管及び取扱い上の注意】

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをして保管すること。（2）小児の手の届かない所に保管すること。（3）他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

成分・分量

1日量12錠（3.6g）中（オウギ2.5g・カンゾウ0.75g・ショウキョウ0.50g・タイソウ1.5g・ビャクジュツ1.5g・ボウイ2.5g）防已黄耆湯エキス（1/2量）2.0g

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有する。

ここからお切りください。

開封後はチャックを閉めて保存してください。

服用前にこの説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

チャック

第2類医薬品 販売名：幸輝防已黄耆湯（こうきぼういおうぎとう）　内容量 84錠（7日分）

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【お客様窓口】
（商品に関するご質問・お問い合わせ）
0120-151-419
（午前9時～午後5時　土・日・祝日を除く）

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】
(独)医薬品医療機器総合機構
0120-149-931

【発売元】
日本生薬漢方株式会社
福岡県福岡市早良区干隈3-16-1

【製造販売元】
大和合同製薬株式会社
奈良県橿原市川西町632-1

製造番号

使用期限

漢方薬