

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。本剤の使用により好ましくない症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

2025年7月改訂 第2版

<壮年性脱毛症における発毛剤>

第1類医薬品

MXプラスローション La

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 未成年者(20歳未満) [国内での使用経験がありません。]
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人。[妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。また、ミノキシジルは母乳中に移行します。]
- (4) 妊娠、出産に伴い脱毛している人。[壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。]
- (5) 避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人。[壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。]
- (6) 壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。[本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。]
- (7) 頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。[男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。]
- (8) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。[壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。]
- (9) 頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人。[壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。]
- (10) 男性。[男性の方は男性用をご使用ください。]

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。[血圧が下がる等のおそれがあります。]
- (2) きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。[きず等を悪化させることがあります。]

3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。[これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。]



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) 高血圧の人、低血圧の人。[本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。]
- (3) 心臓又は腎臓に障害のある人。[本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。]
- (4) むくみのある人。[むくみを増強させる可能性が考えられます。]
- (5) 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。[壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。]
- (6) 高齢者(65歳以上)。[一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。]
- (7) 次の診断を受けている人。甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。[甲状腺機能疾患による脱毛の可能性ががあります。]

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循 環 器	胸の痛み、心拍が速くなる
代 謝 系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ

* 頭皮以外にあらわれることもあります。

3. 6ヶ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

➢ 脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度。(太い毛だけでなく細い短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)[男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。]

4. 使用開始後6ヶ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

➢ 頭頂部だけでなく側頭部や後頭部などの頭部全体の脱毛、頭髮以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛など。[男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。]

■その他の注意

1. 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヶ月間、毎日使用してください。[本剤の有効性は6ヶ月間使用した場合に認められています。]
2. 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。
3. 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。[本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。]

【効能・効果】

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。

この医薬品の対象となる壮年性脱毛症



図よりも脱毛している場合には、効果が得られない可能性があります。

【成分・分量】 100mL中

有効成分	分 量	は た ら き
ミノキシジル	1.0g	発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。
ビリドキシン塩酸塩	0.05g	過酸化物質やフケの発生の原因となる皮脂の過剰な分泌を抑制します。
トコフェロール酢酸エステル	0.08g	皮脂の酸化を防ぎ、頭皮を保護します。
ℓ-メントール	0.3g	頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあたえます。

添加物として、1,3-ブチレングリコール、クエン酸Na、エタノール、香料を含む。

【用法・用量】

成人女性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。

1回1mLのご使用は、脱毛範囲の大小に関係なくお守りください。1mLは塗り広げれば、頭皮全体に十分に行きわたる量として設計してあります。なお、容器は1mLを計量できるタイプです。

<用法・用量に関連する注意>


1. 用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください。(決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります。)
2. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
3. 薬液のついた手で、目などの粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
4. 髪の長い人は、髪を押し広げ、髪に薬液がつかぬよう、頭皮に丁寧に塗布してください。
5. アルコールなどに溶けるおそれのあるもの(メガネわく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。
6. 整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
7. 染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。
8. つけ毛やヘアピースを着用の方は本剤を十分に乾燥させた後に装着してください。

【容器の使用方法】

*容器は、誤飲防止のため計量部と容器本体が外れなくなっています。


1. 確認(キャップの確認)

キャップがしっかり閉まっていることを確認してください。




2. 開封(キャップをはずす)

容器を縦の状態にして、キャップを反時計回りに回して外してください。逆さや斜めの状態でキャップを外すと製剤がたれるおそれがありますのでご注意ください。



3. 計量(容器を逆さにする)

ノズル先端部分が真下を向くように容器を逆さにすると計量部に約1mLの製剤が溜まります。計量部内に製剤が溜まっていることを確認してください。溜まっていない場合には、もう一度キャップをしっかりと閉め、「1. 確認(キャップの確認)」から行なってください。



4. 塗布(頭皮に塗布する)


容器を逆にした状態のまま、ノズル先端部分を頭皮に当て、垂直にポンと押すと製剤が出てきます。その後はトントンとやさしく頭皮に接触させて塗布を繰り返してください。



5. 終了(キャップを閉める)

製剤が完全に出なくなったら塗布が終了です。キャップを時計回りに回しながらしっかり閉めて保管してください。

- ・しっかり閉めない、次回、容器を逆さにしても計量部に製剤が溜まらず、製剤を計量できない原因ともなります。
- ・必ず液が完全に出なくなるまで塗布してください。液が残っていると、液モレ、とびちりの原因になります。



【保管及び取り扱い上の注意】

1. 使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所を避け、涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 火気に近づけないでください。[火気に近づけると引火するおそれがあります。]
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【ご使用にあたって】

髪質や特定の箇所を集中塗布することで、髪がごわついたり、成分が結晶化して髪の一部が白くなることがあります。頭皮を清潔に保つため、毎日洗髪し、用法・用量を守ってご使用ください。

正しい洗髪方法

1. 髪と頭皮の汚れをぬるま湯で洗い流します。
2. 洗髪する際の髪への摩擦を少なくするため、シャンプーは直接髪に塗布せず、手のひらで泡立てたのちに、頭皮をマッサージするように、指の腹で洗います。
3. すずぎ残りはふけ・かゆみの原因になりますので、シャンプーをしっかりと洗い流します。

製造販売元 **ダイヤ製薬株式会社**
〒634-0803奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室TEL:0744-21-5588
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

内容量 60mL
MADE IN JAPAN