

1日1回で効く医薬品

楽歩薬



3つの悩みにアプローチ

神経痛
関節痛
手足のしびれ

(イメージ図)

第3類医薬品 ビタミンB1・B6・B12



1日1回2~3錠

90錠

販売名: 楽歩薬 第3類医薬品

ビタミンB₁、B₆、B₁₂主薬製剤

△【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
便秘、軟便、下痢
- 1か月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。
出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛、関節痛（肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労（慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み）

「ただし、これらの症状について、1か月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₁、B₆、B₁₂の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】 15歳以上、1回2～3錠を1日1回、食後すぐに水またはお湯で、かまずに服用して下さい。

＜用法・用量に関連する注意＞用法・用量を厳守して下さい。

【成分・分量】 1日量（3錠中）フルスルチアミン（ビタミンB₁）として100mg〔フルスルチアミン塩酸塩109.16mg〕、トコフェロールコハク酸エステルとして100mg〔トコフェロールコハク酸エステルカルシウム103.58mg〕、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）100mg、ニコチン酸アミド60mg、ガンマーオリザノール10mg、パントテン酸カルシウム30mg、シアノコバラミン（ビタミンB₁₂）1,500μg、添加物として、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、リボフラビン、カルナウバロウを含む。

【保存及び取り扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉じて保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり、品質が変わります）。(4) アルミ袋の閉め方が不十分な場合は、湿気などの影響により本剤が変質する恐れがありますので、服用後はそのつど必ずチャックをしっかり閉めて下さい。(5) ぬれた手で触れないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じる事があります。また、ぬれた錠剤を袋に戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお期限内であっても、一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6か月以内に服用して下さい。

【発売元】 株式会社 ファンファレ 福岡県糸島市多久418-7

【製造販売元】 至誠堂製薬株式会社 奈良県御所市茅原220-1

【副作用被害救済制度】 ☎0120-149-931

本製品についてのお問い合わせは、

下記にお願い申し上げます。

版No.1

MADE IN JAPAN

お問い合わせ窓口

☎0120-220-883

9:00～18:00(土・日・祝日を除く)



使用期限

製造番号



4