

ご使用に際して、この文書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

目の疲れ・目のかすみ(目やにの多いときなど)に

第3類医薬品

アイルビー40EX 15mL

眼科用薬

近頃、パソコン、テレビ、ゲームやスマートフォンなどの急速な普及により、私たちの目はさまざまなストレスを受けています。こうした機器(VDT:端末表示機器/Visual Display Terminal)の画面を長時間凝視することによって起こる、目や身体の不調がVDT症候群です。目に関する症状としては「目の疲れ、目のかすみ、目の乾きや視力の低下を感じる」などがあげられます。特に目の疲れはピント調節をつかさどる毛様体筋が疲労し、うまく機能しなくなることが主な原因です。

「アイルビー40EX」は毛様体筋に直接働きかけて目のコリをほぐすネオスチグミンメチル硫酸塩をはじめ、ビタミン類やアミノ酸類などの7つの有効成分を配合し、目の疲れや目のかすみなどの症状をやわらげ、目をリフレッシュしてくれる点眼薬です。

⚠️[使用上の注意]



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人：はげしい目の痛み。
 - 次の診断を受けた人：緑内障。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、 かゆみ
目	充血、 かゆみ、 はれ
- 次の場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 目のかすみが改善されない場合。
 - 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】 目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量、成分、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

【用法・用量】

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

＜用法・用量に関する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますのでご注意ください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズの装着液として、またソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)本剤は、点眼用にのみ使用してください。

【成分・分量】

有効成分	含有量 (100 mL中)	はたらき
①ネオスチグミンメチル硫酸塩	5 mg	毛様体筋のピント調節機能低下を改善し、目の疲れをやわらげます。
②グリチルリチン酸二カリウム	250 mg	炎症による目のかゆみ、まぶたのただれなどの症状を改善します。
③ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	50 mg	角膜細胞の新陳代謝を促進し、目の疲労回復に有効です。
④トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	25 mg	血行改善作用により、目への栄養補給が促され、疲れた目の回復を助けます。
⑤L-アスパラギン酸マグネシウム ・カリウム(等量混合物)	1000 mg	アミノ酸の一種で、目の細胞呼吸活性化とともに栄養を与え、目の疲れを癒します。
⑥タウリン	500 mg	目に栄養をあたえるとともに代謝改善作用が痛んだ目の組織修復を助けます。
⑦コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	250 mg	角膜を保護し、目にうるおいをあたえ、栄養補給を促進します。

添加物としてエデト酸ナトリウム水和物、ホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、グリセリン、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物液、ポリソルベート80を含有しています。

＜成分・分量に関する注意＞

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化が生じるおそれがあります。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかにご使用ください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってからご使用ください。
- (7)容器に他のものを入れて使用しないでください。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記までお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電 話： 03-3370-7174 受付時間：午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元 日邦薬品工業株式会社 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16

企 画 元 牛津製薬株式会社 〒849-0304 佐賀県小城市牛津町下砥川1-2

製造販売元 佐賀製薬株式会社 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481