

ご使用に際して、この文書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

## ピンクの目薬

第3類医薬品

## アイルビーNEXT 15mL

眼科用薬

シアノコバラミン(ビタミンB<sub>12</sub>)  
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 配合

最近の生活環境は、わたし達の目に何かと負担をかけることが多くなってきています。テレビ、読書、車の運転、OA機器の使用、そして一歩外に出れば、ホコリや強い日差しと、毎日の生活の中で知らず知らずのうちに目を酷使し、疲れたり、充血したりする症状が多くなってきています。そんな時に「アイルビーNEXT」をお使いください。目の病気の治療に必要な成分と予防に役立つ成分が配合され、目の疲れや目のかすみなどの症状をやわらげます。

## ⚠️[使用上の注意]



## 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み。
  - (4) 次の診断を受けた人：緑内障。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症 状         |
|------|-------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、 かゆみ  |
| 目    | 充血、 かゆみ、 はれ |
- 次の場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 目のかすみ改善されない場合。
  - (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】 目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)。

用法・用量、成分、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

## 【用法・用量】

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

### ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますのでご注意ください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズの装着液として、またソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)本剤は、点眼用にのみ使用してください。

## 【成分・分量】

| 有効成分                                | 含有量<br>(100 mL中) | はたらき                                 |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| ①シアノコバラミン<br>(ビタミンB <sub>12</sub> ) | 4mg              | 目の調節機能を高めるとともに目の新陳代謝を活発にし、目の疲れをとります。 |
| ②クロルフェニラミンマレイン酸塩                    | 10mg             | 抗アレルギー作用により、目の炎症や、かゆみをやわらげます。        |
| ③タウリン                               | 100mg            | 目に栄養を与え、ビタミン類の吸収を促す作用があります。          |
| ④コンドロイチン硫酸エステル<br>ナトリウム             | 100mg            | 角膜表層を保護し、機能低下した目の働きを改善します。           |

添加物としてホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、*d*-ボルネオール、パラオキシ安息香酸メチルを含有しています。

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化が生じるおそれがあります。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかにご使用ください。
- (6)液色は成分の色です。液剤が衣服などに付くと着色することがありますので、付かないように十分注意してください。
- (7)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってからご使用ください。
- (8)容器に他のものを入れて使用しないでください。

### お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記までお願い申し上げます。

**日邦薬品工業株式会社** お客様相談窓口

電話： **03-3370-7174** 受付時間：午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **日邦薬品工業株式会社** 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16

企画元 **牛津製薬株式会社** 〒849-0304 佐賀県小城市牛津町下砥川1-2

製造販売元 **佐賀製薬株式会社** 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481