

ご使用に際して、この文書を必ずお読みください。また、必要ときにすぐ読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

アイルビーローズNEO

15mL

眼科用薬

パソコン、テレビ、ゲームや携帯電話などの使用により目を酷使すると、「目の疲れ、目のかすみ、ピントが合いにくい、目の乾燥感を感じる」などの症状が現れます。

- 塩酸テトラヒドロゾリンが結膜の充血を取り除き、クロルフェニラミンマレイン酸塩の抗ヒスタミン作用により目のかゆみをやわらげます。
- ネオスチグミンメチル硫酸塩がピント調節機能を回復させ、疲れ目を改善します。
- ビタミン・アミノ酸類が、新陳代謝の促進、栄養補給や酸素補給を助け、疲れた目の働きを活発にします。また、涙の蒸発を防止し、目にうるおいをあたえます。

⚠️[使用上の注意]



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み。
- (4) 次の診断を受けた人：緑内障。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、 かゆみ
目	充血、 かゆみ、 はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】 目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

【用法・用量】 1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますのでご注意ください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5) ソフトコンタクトレンズの装着液として、またソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6) 本剤は、点眼用にのみ使用してください。

【成分・分量】

有効成分	含有量 (100 mL中)	はたらき
①塩酸テトラヒドロゾリン	50mg	末梢血管収縮作用により、結膜(白目の部分)の充血を取り除きます。
②ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピント調節機能の低下を改善し、目の疲れを改善します。
③クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により目のかゆみをやわらげます。
④シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	20mg	毛様体筋の働きを活発にし、目の疲れを改善します。
⑤ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	50mg	角膜細胞の新陳代謝を促進し、目の疲労回復に有効です。
⑥パンテノール	50mg	活発な新陳代謝に必要な栄養分として働き、目を守ります。
⑦L-アスパラギン酸マグネシウム ・カリウム(等量混合物)	1000mg	アミノ酸の一種で、目の細胞呼吸の活性化とともに栄養を与え、目の疲れを癒します。
⑧コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	500mg	角膜を保護し、目に潤いを与え、栄養補給を促進します。

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、ホウ酸、イプシロン-アミノカプロン酸、d-カンフル、ℓ-メントール、グリセリン、クロロブタノール、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチルを含有しています。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化が生じるおそれがあります。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかにご使用ください。
- (6)保存状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってからご使用ください。
- (7)液色は成分の色です。液剤が衣服などに付くと着色することがありますので、付かないように十分注意してください。
- (8)容器に他のものを入れて使用しないでください。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記までお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電 話： **03-3370-7174** 受付時間：午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元 **日邦薬品工業株式会社** 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16

企 画 元 **牛 津 製 薬 株 式 会 社** 〒849-0304 佐賀県小城市牛津町下砥川1-2

製造販売元 **佐 賀 製 薬 株 式 会 社** 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481