

# 足がつる

こむらがえりと**痛み**に**効く!** 錠剤 (原寸大)

## コムレケア<sup>a</sup>

**生薬最大量抽出** ※1より

**満量処方** ※2



第2類医薬品

※1日本薬局方芍薬甘草湯エキス内  
体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みの  
あるものの次の諸症:こむらがえり、筋肉のけいれん、腰痛、腰痛

### 効能・効果

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みの  
あるものの次の諸症:こむらがえり、筋肉のけいれん、腰痛、腰痛

Medicine for Leg Cramps

漢方製剤

### 用法・用量

大人(15才以上) 1回4錠、7才以上15才未満1回  
2錠、1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用  
してください(7才未満は服用しないこと)

<用法・用量に関連する注意> (1)定められた用法・用量  
を厳守すること (2)小児に服用させる場合には、保護者  
の指導監督のもとに服用させること ●食間とは「食事と  
食事の間」を意味し、食後約 2~3 時間のことをいいます

### △使用上の注意

※**決してはいけないこと** (守らないと現在の  
の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくな  
る) 1. 次の診断を受けた人は服用しないこと:心臓病 2. 症状があるときのみの服用にと  
どめ、連用しないこと

■**相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医  
師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠  
していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 次の症  
状のある人: むくみ (5) 次の診断を受けた人:  
高血圧、腎臓病 2. 服用後、次の症状があら  
われた場合は副作用の可能性があるので、  
直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談すること。まれ  
に右記の重篤な症状が起こることがある  
その場合は直ちに医師の診療を受けること

| 症状の名称                   | 症状                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 間質性<br>肺炎               | 階段を上ったり、少し無理をしたりす<br>ると息切れがする・息苦しくなる、空せ<br>き、発熱等がみられ、これらが急<br>にあらわれたり、持続したりする |
| 偽アルド<br>ステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感<br>やこばりに加えて、脱力感、筋<br>肉痛があらわれ、徐々に強くなる                         |
| うっ血性<br>心不全、<br>心室頻拍    | 全身のだるさ、動悸、息切れ、<br>胸部の不快感、胸が痛む、めまい、<br>失神等があらわれる                               |
| 肝機能<br>障害               | 発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白<br>目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだ<br>るさ、食欲不振等があらわれる                     |

3. 5~6回服用しても症状がよくなるない  
場合は服用を中止し、この箱を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談すること

※2満量処方: 日本薬局方芍薬甘草湯12g  
処方から抽出したエキスを全量(最大量) 配合

服用に際して、この説明書を必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

成分・分量 1日量(12錠)中

MADE IN JAPAN

芍薬甘草湯エキス 2400mg[ ジャクヤク・カンゾウ 各6.0g  
より抽出 ] 添加物として、CMC-Ca、二酸化ケイ素、ステアリン  
酸 Mg、タルク、セルロースを含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、  
錠剤の色が多少異なることがあります

### 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること(2)小児の手の  
届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因に  
なったり品質が変わる)(4)本剤をぬれた手で扱わないこと(5)1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋  
の口を2回以上折り返して保管すること。また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求  
めのお店又はお客様相談室  
にお願いいたします

あったらいいな/をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社  
〒562-0029 大阪府箕面市彩都薬生北44-06