

使用に際して、この説明書きを必ずお読み
ください。また必要なときに読めるよう大
切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

第3類医薬品

販売名：サカムケアa 液体ばんそうこう

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が
悪化したり、副作用が起こりやすくなる) **次の部位には使用しないこと**
(1)ただれ、化膿している患部 (2)目や目の周囲、粘膜等
(3)大きなキズ、深いキズ、湿疹及び出血している患部

📞 相談すること 1.次の人は使用前に医師、薬剤師
又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けて
いる人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことが
ある人 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作
用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を
持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止
し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効 能・効 果 さかむけ、すりきず、ひび、あかぎれ、小きりきず

用 法・用 量 患部を清潔にし、傷部のみに適量を塗り、そのま
ま静かに乾燥させてください

〈用法・用量に関連する注意〉(1)患部やその周辺が汚れたまま使
用しないこと (2)患部が汗や水でぬれている場合は水分をよく拭
き取ってから使用すること (3)目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに
眼科医の診療を受けること (4)小児に使用させる場合には、保護
者の指導監督のもとに使用させること (5)本剤は、外用にのみ使
用し、絶対に内服しないこと (6)傷に塗ったとき、一瞬しみますが
乾燥するとしみなくなります (7)使用後にハケを水で洗わないこ
と(薬剤が水に触れるとゲル状に固まることがある)

成 分・分 量 100g中

成 分	分 量	はたらき
ピロキシリン	12g	被膜を作り、患部をおおう

添加物として、パルミチン酸イソプロピル、ヒマシ油、dl-カンフル、トコフェロール酢酸
エステル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ベンジルアルコール、イソプロパノールを含有する

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気
の少ない涼しい所に必ず密栓して保管すること(密栓しないと薬剤
が固まり使えなくなる) (2)小児の手の届かない所に保管すること
(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が
変わる) (4)火気に近づけないこと(イソプロパノール含有物) (5)誤飲
(指をしゃぶる等)のおそれがある場合は使用をさけること

●急いではがしたいときは、本品を上塗りし、乾かないうちに拭き
取ってください●衣類・家具等につくと、とれにくいので、つかない
ように注意すること●成分により、ハケや軸の色が変わることがあ
りますが、品質上問題ありません

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製造販売元 **小林製薬株式会社**

〒562-0029 大阪府箕面市彩都薬生北41-66

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

MADE IN JAPAN