

**二日酔いの  
むかつき**

**胃のもたれ**

**食欲不振**

**ウコン&  
カンゾウ  
配合**

**生薬配合胃腸薬  
イスタート  
胃腸内服液**

**第3類医薬品 30mL**

**イスタート胃腸内服液**

**第3類医薬品**

⚠ (使用上の注意)

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
医師の治療を受けている人。
2. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、  
この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】1日量(30mL×2本)中  
ウコン流エキス……………0.4mL  
(ウコンとして400mg)  
カンゾウエキス……………150mg  
(カンゾウとして600mg)  
ニンジンエキス……………63mg  
(ニンジンとして699.3mg)  
チンピエキス……………140mg  
(チンピとして700mg)  
ショウキョウ流エキス……0.4mL  
(ショウキョウとして400mg)  
ソウジツ流エキス…………0.48mL  
(ソウジツとして480mg)  
カルニチン塩化物…………120mg  
添加物としてセンプリエキス、ハッカ油、  
トメントール、ポリドン、ポリオキシエ  
チレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート  
80、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、  
安息香酸Na、白糖、プロピレングリコ  
ール、香料を含有します。

【効能・効果】

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部  
膨満感、消化不良、胃痛、食べ過ぎ  
(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸  
やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、  
はきけ(むかつき)、胃のむかつき、  
二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、  
悪心)、嘔吐

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(30mL)  
を1日2回服用してください。なお、  
服用間隔は、4時間以上おいてく  
ださい。15歳未満は服用しない  
てください。

＜用法・用量に関連する注意＞

用法・用量を厳守すること

●保管及び取扱い上の注意(1)直射日光の当たらない  
涼暗の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届  
かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこ  
と(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)表示の使用  
期限を過ぎた製品は服用しないこと。  
※本品は生薬が配合されていますので、まれに沈殿を生じ  
ることがあります。よく振ってから服用してください。

ガラス：ビン  
金 属：キャップ

製造販売元 02ISELAJ 製造番号

**中外医薬生産株式会社**  
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5



使用期限

