

販売名：リキポリン3000

〔成分・分量〕(100mL中)

リボフラビンリン酸エステルナトリウム…5mg、ピリ
ドキシン塩酸塩…10mg、ニコチン酸アミド…25mg、
無水カフェイン…50mg、タウリン…3000mg、L-ア
スパラギン酸カリウム…100mg、L-アスパラギン酸
マグネシウム…100mg

添加物：安息香酸Na、パラベン、クエン酸、
白糖、エタノール、pH調整剤2成分、香料

◎本剤に配合されているリボフラビンリン
酸エステルナトリウムにより、尿が黄色く
なることがあります。

〔効能・効果〕

○滋養強壮○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの
場合の栄養補給

〔用法・用量〕

大人(15才以上)1日1回1びん(100mL)
服用

◎用法・用量を厳守してください。
(他のビタミン等を含有する製品を同時に
使用する場合には過剰摂取等に注意して
ください)

ガラス：びん 金属：キャップ

B

T-280

指定医薬部外品 滋養強壮・栄養補給

リキポリン[®]3000

100mL

タウリン
3000mg
配合

ビタミンB₂・B₆配合

製造販売元  テイカ製薬株式会社
富山市荒川一丁目3番27号

〔使用上の注意〕

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師
又は薬剤師に相談してくだ
さい 医師の治療を受けて
いる人。(腎臓疾患で電解
質の摂取制限を受けてい
る人など) 2. 次の場合は、
服用を中止し、この製品を
持って医師又は薬剤師に
相談してください (1) 発疹、
悪心・嘔吐、胃部不快感、
軟便・下痢、便秘などの症
状があらわれた場合。(2) し
ばらく服用しても症状の改
善がみられない場合。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管し
てください。2. 小児の手の届かない所に保
管してください。3. 他の容器に入れ替えない
でください。(誤用の原因になったり品質
が変わります。) 4. 使用期限の過ぎた製品
は、服用しないでください。

お客様相談係 076-431-8863 [テイカ製薬(株)]

使 用
期 限
(西暦年月)

製 造
番 号

4 987399 045040