

より良い漢方を

漢方製剤

太陽

内容量
150g

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚(ひふ)	発疹・発赤、かゆみ	消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

	症 状
偽アルドステロン症	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

頭痛、発熱、悪寒があり、後頸部、肩、背部に至る緊張感(こり)があり、自然発汗はなく、比較的体力のあるものに用いる。感冒。肩こり。肩甲部の神経痛。

■ 用法・用量

1日3回食後に、湯または水にて服用してください。

大 人	1回量 20丸	4才未満2才迄	1回量 4丸
15才未満7才迄	1回量 10丸	2才未満	1回量 2丸
7才未満4才迄	1回量 6丸		

＜用法・用量に関連する注意＞

(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(3)幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。(4)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

■ 成分・分量 (1丸、100 mg) 中

日本薬局方 カンコン …… 25.0mg	日本薬局方 ショウキョウ… 10.0mg
日本薬局方 カンゾウ …… 10.0mg	日本薬局方 タイソウ …… 15.0mg
日本薬局方 ケイヒ …… 10.0mg	日本薬局方 マオウ …… 15.0mg
日本薬局方 シャクヤク… 10.0mg	添加物としてコメデンプンを含有する

＜保管及び取扱い上の注意＞

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)(4)本剤は天産物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります、効果には変わりありません。(5)本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを食べたりしないようご注意ください。

【発売元・お問合せ先】

日の丸漢方

京都市下京区室町通六条下ル

TEL 075-351-6810

【製造販売元】

株式会社栃本天海堂

大阪市北区末広町3番21号

製造番号

00000000

副作用被害救済制度

☎0120-149-931