

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ネオグロンビター内服液
ゴールド(滋養強壮薬)

使用上の注意〔相談すること〕 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。皮膚：発疹・消化器：胃部不快感・下痢 2.しばらく服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。成分・分量 1日量(30mL)中チアミン硝化物(ビタミンB1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)25mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg、タウリン1,000mg、ニンジンエキス40.3mg(原生薬換算量600mg)、オウギ流工キス0.3mL(原生薬換算量300mg)、ジオウ流工キス0.3mL(原生薬換算量300mg)、タインウ流工キス0.1mL(原生薬換算量100mg)、トウキ流工キス0.2mL(原生薬換算量200mg)、添加物：pH調節剤(クエン酸)、安息香酸Na、パラベン、ポピドン、アセスルファムK、液糖、D-ソルビトール、香料(安息香酸ベンジル、エタノール、エチルパニリン、グリセリン、大豆油、パニリン、プロピレングリコール、フェノール、l-メントール)(アルコール)

発熱性消耗性疾患時の
栄養補給

ネオグロンビター
内服液ゴールド

滋養強壮



第3類医薬品 30mL

常盤薬品

NOEVIR GROUP

0.4mL以下)●ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。効能・効果 ○滋養強壮○虚弱体質○肉体的疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 用法・用量 成人(15才以上)1日1回、1本(30mL)を服用すること。＜用法・用量に関連する注意＞(1)内服にのみ使用すること。(2)用法・用量を守ること。(3)服用時にはアンプルの頸部を折り、添付のストローで吸飲すること。保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社
神戸市中央区港島中町6-13-1
製造販売元
三重県伊賀市白檜字永谷2604-5
お問い合わせは
0120-875-710まで
副作用被害救済制度
0120-149-931
400円(税別)

114400
FSC902

使用
期限
製造
番号



アンプル：PP
ラベル：PET