

朝 夜

1日2回でよく効く

葛根湯  
内服液NY 2

体力中等度以上の方の

かぜのひき始め

鼻かぜ・頭痛

45mL

第2類医薬品

販売名:葛根湯内服液・NY2

△ 使用上の注意

■ 相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害  
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5〜6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造販売元  
日本薬剤株式会社  
富山市東中野町一丁目1番1号  
(お問い合わせ先)電話076-424-2239

ガラス:瓶 金属:キャップ 91A1

【成分・分量】1日量2本(90mL)中

葛根湯エキス…………… 8300mg  
〔カコン 8.0g、マオウ 4.0g、タイソウ 4.0g、ケイヒ 3.0g、  
シヤクヤク 3.0g、カンソウ 2.0g、ショウキョウ 1.0g〕  
より製したエキス

添加物として、白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、エタノール、グリセリン、トメントール、プロピレングリコール、バニリン、ベンジルアルコール、香料を含有する。

【効能・効果】体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】成人(15歳以上)1回1本、1日2回朝夕、食前又は食間に服用してください。微量の沈殿が生じる場合があるので、よく振ってから服用してください。(用法・用量に関連する注意)(1)用法・用量を厳守してください。(2)15歳未満の小児には服用させないでください。(3)本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限

製造記号



4

582451710302