

項目	内容						
医薬品区分	配置用医薬品						
薬効分類	葛根湯						
承認販売名	カゼファースト内服液 S						
製品名	カゼファースト内服液 S						
製品名（読み）	カゼファーストナイフクエキエス						
製品の特徴							
使用上の注意	■してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります） 短期間の服用にとどめ、連用しないでください ■相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください （1）医師の治療を受けている人。 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。 （3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。 （4）胃腸の弱い人。 （5）発汗傾向の著しい人。 （6）高齢者。 （7）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 （8）次の症状のある人。 むくみ、排尿困難 （9）次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 〔関係部位：症状〕 皮膚：発疹・発赤、かゆみ 消化器：吐き気、食欲不振、胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 〔症状の名称：症状〕 偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 <u>多形紅斑：皮膚が広い範囲で赤くなる、水泡が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。※</u> 3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください						
効能・効果	かぜの初期症状（発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み）						
効能関連注意							
用法・用量	成人（15歳以上）1回1本(30mL)、1日3回食間に服用してください。まれに微量の沈殿が生じる場合があるので、よく振ってから服用してください。						
用法関連注意	（1）用法・用量を厳守してください。 （2）15歳未満の小児には服用させないでください。 （3）成人（15歳以上）は1回1本とし、1日3本を超えて服用しないでください。 （4）本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。						
成分分量	1日量3本(90mL)中 <table><tr><th>成分</th><th>分量</th><th>内訳</th></tr><tr><td>葛根湯エキス</td><td>8300mg</td><td>（カッコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g）</td></tr></table>	成分	分量	内訳	葛根湯エキス	8300mg	（カッコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g）
成分	分量	内訳					
葛根湯エキス	8300mg	（カッコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g）					
添加物	白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、エタノール、グリセリン、l-メントール、プロピレングリコール、バニリン、香料						
保管及び取扱い上の注意	（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。 （2）小児の手のとどかない所に保管してください。 （3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。） （4）使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。						
消費者相談窓口	会社名：株式会社廣貴堂 問い合わせ先：お客様相談窓口 電話番号：076-424-2259						
製造販売会社	（株）廣貴堂 添付文書情報 会社名：株式会社廣貴堂 住所：富山市梅沢町2丁目9-1						
販売会社							
剤形	液剤						
リスク区分等	第2類医薬品						