

第2類医薬品

販売名：ルグナン葛根湯液

開け口

ご使用に際して、外箱の説明文
を必ずお読みください。また、必
要な時に読めるよう商品と共に
大切に保管してください。

用法・用量

次の量を、食前又は食間によく振ってから服用してください。

年 齢	1 回 量	服用回数
成人(15才以上)	1本(30mL)	1日3回
15才未満	✕ 服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤は1回1本飲みきりです。(3)本剤は本質的に沈殿を含んでいまずので、よく振ってから服用してください。

効 能

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

成分・分量 1日量 90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス……………4.34g
(カッコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、
シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)

添加物：キシリトール、スクラロース、D-ソルビトール、ク
エン酸Na水和物、クエン酸水和物、ポリオキシエチレン硬
化ヒシ油、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、安息
香酸Na、パラベン、アルコール、香料

使用期限
製造番号

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。(5)生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないでください。

第2類医薬品

葛根湯

満量処方

頭痛

鼻かぜ

肩こり

かぜのひきはじめに

製造販売元

小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

製品についてのお問い合わせは、お
買い求めのお店又は下記にお願い
申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：0120-584-419

受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)