

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要
なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痛・消炎パップ剤

フリーオクールS

第3類医薬品

特 徴

- フリーオクールSは、鎮痛・消炎効果と冷湿布作用をあわせもった鎮痛・消炎冷感パップ剤です。
- フリーオクールSは、4種の有効成分（サリチル酸メチル、*l*-メントール、トコフェロール酢酸エステル、ジフェンヒドラミン塩酸塩）の働きで、肩こり、打撲、筋肉痛などによく効きます。
- フリーオクールSは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
次の部位には使用しないこと
（1）目の周囲、粘膜等。
（2）湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

腰痛、打撲（うちみ）、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）用法・用量を厳守すること。
- （2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- （3）汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。

【成分・分量】 膏体 100g(1400cm²)中

サリチル酸メチル ……………1.0g *l*-メントール ……………1.0g
トコフェロール酢酸エステル…0.3g ジフェンヒドラミン塩酸塩…0.1g
添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分
中和物、エデト酸 Na、酸化チタン、pH 調節剤、その他 4 成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- （2）小児の手の届かない所に保管すること。
- （3）他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- （4）未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。
- （5）使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用すること。

【包 装】 48枚入 [8枚×6袋] (1枚:14cm×10cm)

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電 話 (0879) 25-2363
受付時間 9:00～17:00
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931

発 売 元
ティコクファルマケア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元
帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

セルフメディケーション
税 控除 対象

