

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

吸湿しやすいため、服用のつど
チャックをしっかりとしめること

販売名: チラック

漢方製剤 第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

- 相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (4) 高齢者 (5) 次の症状のある人: むくみ (6) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |
- まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること
- | 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる |
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 下痢 4. 1ヶ月位(持出血に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 体力中等度以下で、冷え症で、出血傾向があり胃腸障害のないものの次の諸症: 月経異常・月経過多・不正出血、痔出血、貧血、皮下出血 **用法・用量** 大人(15才以上) 1回5錠、1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(15才未満は服用しないこと) <用法・用量に関連する注意>定められた用法・用量を厳守すること ●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます **成分・分量** 1日量(15錠)中 芍薬抽出液エキス 3.8g〔センキュウ・カンゾウ・ガイヨウ・ゼラチン 各1.5g、トウキ・ジャクヤク 各2.25g、ジオウ 3.0g より抽出〕添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する ●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります **保管及び取扱い上の注意** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりとめて保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都薬生北4-4-66

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

MADE IN JAPAN