

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと


販売名: **クッチエイド** 第2類医薬品

外用皮膚・湿疹用薬 Anti-Itch Ointment

効能・効果 湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、おむつかぶれ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関連する注意>(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(2)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うことなお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(3)外用にのみ使用すること(4)患部を清潔にした後、塗布すること



成分・分量 100g中

ウフェナマート5.0g、グリチルレチン酸0.3g、イソプロピルメチルフェノール0.1g、アラントイン0.2g
添加物として、ワセリン、グリセリン、ゲル化炭化水素、マイクロクリスタリンワックス、サラシミツロウ、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ポリソルベート80、パラベン、イソステアリン酸、パルミチン酸デキストリン、香料を含有する

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)火気に近づけないこと●冬期など気温が低い時に製剤が硬くなって出しにくい場合は、手でチューブを温めてからご使用ください



10217255

△使用上の注意 **★相談すること** **1.**次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)湿潤やただれのひどい人 **2.**使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感

3.1～2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

製品のお問合せ
は、お買い求め
のお店又はお客
様相談室にお願い
いたします
MADE IN JAPAN

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)
製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3