

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

消炎鎮痛パップ剤

第3類医薬品 販売名：温感ゲリックシップS

【特長】

- 消炎鎮痛効果と温感作用をあわせもったパップ剤です。
- サリチル酸グリコール、*l*-メントール、トコフェロール酢酸エステル、トウガラシエキスの配合により、肩こり、腰痛、関節痛などによく効きます。
- 粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリとフィットします。



【使用上の注意】



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
株式会社大石膏盛堂
電 話 (0942) 83-2112
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

【効能・効果】

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日1～2回、患部に貼付してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。
- (3) 薬面に触れた手で目、唇、鼻孔、その他の粘膜には触らないでください。
- (4) 打撲、捻挫にははれがひいてからご使用ください。
- (5) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (6) 少なくとも入浴の1時間前にははがしてください。また入浴後は30分位してからお貼りください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量
サリチル酸グリコール	2.0g
<i>l</i> -メントール	1.0g
トコフェロール酢酸エステル	1.0g
トウガラシエキス	0.30g(原生薬換算量3.75g)

添加物としてエデト酸ナトリウム、カルメロースナトリウム、グリセリン、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、pH調節剤、ヒマシ油、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、その他1成分

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



製造販売元

株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町一丁目933番地

ここを押して
開けました。