

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【特 長】

- 有効成分フェルピナクを70mg配合しています。
- フェルピナクが痛みの原因(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節などの痛みにも効果的です。
- 可動部にもびったりフィットする、伸縮性のテープ剤です。
- においがひかえめ(微香性)で気になりません。
- ライナーに3分割フィルムを採用していますので、貼りやすいです。
- チャック付の薬袋で、未使用分の保管に便利です。

【効果・効能】

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・首の痛みとは)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【用法及び用量】

表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

15歳未満の小児は使用しないでください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】膏体 100g(10000cm²) 中 (1枚10cmX14cm、膏体量1.4g)

フェルピナク……5.0g(1枚中フェルピナク70mg)

添加物:クロタミント、トメントール、ジイソプロパノールアミン、ジブチルヒドロキシルエン、モノオレイン酸ソルビタン、1,3-ブチレングリコール、メタクリル酸・アクリル酸n-ブチルコポリマー、天然ゴムラテックス、SBR合成ラテックス、ポリブテン、軽質流動パラフィン

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のチャックをしっかりしめ、外気にふれないようにして保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。

鎮痛消炎テープ剤 第2類医薬品

**フェルピナクテープ
(NAGAWA)**

10枚入

ご使用に際して、この袋の説明書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

(お問い合わせ先)

ナガワ薬品株式会社

電 話: 0120-1717-51

受付時間: 9:30～17:30(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

製造販売元

ナガワ薬品株式会社

東京都台東区東上野1-17-2第二江口ビル3階

使用開始日記入欄



4 570091 952022