

本品には添付文書はありませんので、
個箱の画像を掲載します。

使用期限(年,月) 製造番号

12包

第2類医薬品

15歳以上

内服 ボラギノール®PRO

いぼ痔・きれ痔
痔出血に

顆粒

12包 1日3包

のみ薬

内服
ボラギノール®PRO

痔の原因に
Wのアプローチ

排便時の刺激やうっ血を緩和

痔の原因に
Wのアプローチ

乙字湯エキス + メリロートエキス 配合

BORRAGINOL PRO ORAL is hemorrhoidal preparation containing
Otsujito extract, Melilot extract and Tocopherol acetate.

第2類医薬品

天藤製薬お客様相談係
☎0120-932-904
受付時間 9:00~17:00
(土、日、休、祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

天藤製薬株式会社
大阪府豊中市
新千里東町一丁目5番3号

製造販売元
全薬工業株式会社
東京都文京区大塚 5-6-15

4 987978 101143

あけ口

第2類医薬品
痔疾用内服薬

外箱が開いていたり、中の包装が破れている等、
開封された形跡がある場合は使用しないでください

効能・効果:次の場合の症状の緩和:痔核(いぼ痔)、きれ痔、痔出血
用法・用量:次の量を服用してください。
年齢 1回量 1日服用回数
成人(15歳以上) 1包 3回
15歳未満 服用しないこと
<用法・用量に関連する注意>
本剤は水又はぬるま湯で服用してください。
成分:(1包1.5g中)
メリロートエキス 25mg
乙字湯エキス 283.3mg
トコフェロール酢酸エステル 33.3mg
添加物:タルク、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、クロスカルメルロースNa、ステアリン酸Mg、セルロース、白糖、無水ケイ酸
△使用上の注意
※してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)
授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
■相談すること
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。下痢
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
関係部位 症状
皮膚 発疹・発赤、かゆみ
消化器 食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛、胃部不快感
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。
症状の名称 症状
肝機能障害 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のたるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎 階段を上ったり、少し無理をしただけで息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、下痢
4.1ヵ月位服用しても症状がよくなり、ない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5.服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
保管及び取扱い上の注意(1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。
この箱は本剤とともに保管し、服用の際によくお読みください。

A 1