

CG90-114T

0050-2937

熱で体がだるい、
食欲がない
そんな時の栄養補給

開け口

第2類医薬品

1回1瓶1日2回 30mL×3

販売名：新キリージェ・リコプラス

【成分・分量】1日量(30mL×2)中
タウリン2000mg、カンゾウエキス1000mg(原生薬カンゾウとして4000mg)、ショウキョウ流エキス1mL(原生薬ショウキョウとして1000mg)、ニンジンエキス60mg(原生薬ニンジンとして666mg)、ヒドロキシナリタン塩(ビタミンB₆)50mg、パンテノール30mg、添加物：白糖、果糖、アセスルファムK、クエン酸、クエン酸Na、バラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料「アルコール0.3mL以下(30mL中)」

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1瓶(30mL)を1日2回服用してください。

服用間隔は4時間以上おいてください。

○用法・用量を厳守すること。

○15歳未満の小児は服用しないこと。

【効能・効果】

滋養強化、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

※本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

お客様相談室：0595-21-3200

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

製造番号

使用期限

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

長期連用しないこと

⊗相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。

むくみ(4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに

服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに

医師の診療を受けること。

3.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この

製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位


皮膚

発疹・発赤、かゆみ

症状の名称

手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

偽アルドステロン症、ミオパシー



熱で体がだるい、食欲がない
そんな時の栄養補給



カンゾウエキス、ニンジンエキス、タウリン配合

第2類医薬品 新キリージェ・リコプラス 30mL×3

液剤|30mL×3

1回1瓶1日2回



熱で体がだるい、食欲がない
そんな時の栄養補給


カンゾウエキス、ニンジンエキス、タウリン配合



ノンカフェイン

新キリージェ・リコプラス

第2類医薬品



01NKJECPP



4 987307 422925



紙箱

ガラス：ビン
金属：キャップ