

✂ ここからお切りください

開封後はチャックをしっかりしめて
保管してください。

第3類医薬品

ビタミンC

しみ・そばかす

日やけ・かぶれによる色素沈着

ROYANC
ロイヤンC錠2000

水なし
楽チン!

チュアブル/135錠
ビタミンC 2,000mg配合

PFI

◀ ここからお切りください。開封後はチャックをしっかりお閉めください。

使用前にこの袋の説明文書を必ずお読みください。

販売名: ロイヤンC錠2000 ビタミンC剤

第3類医薬品

【効能・効果】

次の諸症状の緩和:しみ,そばかす,日やけ・かぶれによる色素沈着 次の場合の出血予防:
歯ぐきからの出血,鼻出血[ただし,これらの症状について,1ヵ月ほど使用しても改善がみ
られない場合は,医師,薬剤師又は歯科医師に相談すること。] 次の場合のビタミンCの
補給:肉体疲労時,妊娠・授乳期,病中病後の体力低下時,老年期

【用法・用量】

1日2~3回服用してください。ただし,1日
2回服用する場合は朝夕,1日3回服用する
場合は朝昼晩,口の中で溶かすか,又はか
みくだいて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	2回(朝夕)~ 3回(朝昼晩)
11歳以上15歳未満	2錠	
5歳以上11歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないでください	

【成分・分量】

成分	成人(15歳以上)1日量(9錠)中
ビタミンCとして 〔アスコルビン酸(ビタミンC) L-アスコルビン酸ナトリウム〕	2,000mg 1,000mg 1,124.79mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	6mg

添加物として,セルロース,乳糖水和物,無水ケイ酸,還元
麦芽糖水アメ,アスパルテーム(L-フェニルアラニン
化合物),ステアリン酸Mg,トコフェロール,香料

【成分・分量に関連する注意】

- (1)本剤の服用により尿及び大便の検査値が影響を受けることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを服用していることを医師にお知らせください。
- (2)リボフラビンにより尿が黄色になる場合があります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)袋内に乾燥剤が入っていますが,服用しないでください。

< 発売元・お問い合わせ先 >

株式会社 ファーマフーズ

京都市西京区御陵大原1番地49

☎0120-678-005 携帯電話 0570-041-005

製造販売元 **明治薬品株式会社**
富山県富山市三郷6番地



副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限/製造番号

