

指定医薬部外品 販売名:ルル滋養内服液プレミアム

服用に際しこの箱の説明書をよく読むこと

▲ 使用上の注意

相対すること 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があり、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位 症状
皮膚 発疹
皮膚 発疹
消化器 胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。下痢、3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果 ●発熱を伴う消耗性疾患時、病中病後の体力低下時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給 ●疲労の回復・予防 ●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防 ●身体がだるい、身体が重い、疲れやすい、疲れが残る、体力がない ●寝付きが悪い、眠りが浅い、目覚めが悪い ●体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善 ●虚脱状態 (知脱による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防

用法・用量 成人(15歳以上)1日1回1本(45mL)を服用して下さい。

(用法・用量に関連する注意) 用法・用量を守って下さい。(他のビタミン等を含む含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)

1本(45mL)中の成分 ビタミンB₁硝酸塩 10mg
ビタミンB₂リン酸エステル.....12mg
ビタミンB₆.....10mg
ニコチン酸アミド.....20mg
ニコチン酸.....270.3mg(人参3000mgに相当)
タイソウエキス.....150mg(大葉750mgに相当)
ケイヒエキス.....6.75mg(根皮150mgに相当)
ショウキョウエキス.....30mg(外葉120mgに相当)
ショウキョウエキス.....9.7mg(生葉1000mgに相当)
デンビエキス.....20mg(陳皮100mgに相当)
トウキエキス.....40mg(当帰200mgに相当)
ローヤルゼリー抽出液.....350mg
(ローヤルゼリー350mgに相当)

(アルコール0.44mL以下)
添加物:ハチミツ、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、希塩酸、エドト酸Ca/Na、安息香酸Na、カラメル、アルコール、香料、パリエリン
※本製品に配合されているビタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

使用期限

製造番号

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-1

https://www.daiichisankeiyohc.co.jp/

製造 田村薬品工業株式会社

販売元 奈良泉御所市西寺田50

ルル[®]
滋養内服液 45mL
プレミアム
人参 3000mg
基準最大量配合

かぜなどの
発熱でだるい時
の栄養補給、
抵抗力の
維持・改善に

8種の生薬配合
ローヤルゼリー 350mg
タイソウ 750mg
ショウキョウ1000mg

ノンカフェイン



第一三共ヘルスケア

製品情報 ▼
Product Info



指定医薬部外品 45mL

Quasi-drugs for nourishment and fortification containing vitamins
(Newly designated quasi-drugs)



(イメージ図)

※ビタミン含有保健剤製造販売承認基準(厚生労働省承認事務効率化のために定めた指定医薬部外品の範囲) 最大量

お問い合わせ先

お客様相談室 0120-337-336

受付時間 9~17時(土、日、祝日を除く)

8種の生薬成分

消耗した体力の回復・滋養強壮に効果のある

人参 (ニンジン) 3000mg

弱った体への栄養補給に適した

ローヤルゼリー 350mg

滋養強壮に効果のある

大棗 (タイソウ) 750mg

体を温める作用のある

陳皮 (チンピ) 100mg

桂皮 (ケイヒ) 150mg

生姜 (ショウキョウ) 1000mg

体を温め、強壮作用のある

当帰 (トウキ) 200mg

芍薬 (シャクヤク) 120mg

+

ビタミン

ビタミンB₁硝酸塩 10mg

ビタミンB₂リン酸エステル 12mg

ビタミンB₆ 10mg

ニコチン酸アミド 20mg

保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- 2.小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 3.他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 4.生薬エキスを配合していますので、ときに沈殿を生じることがありますが、効果には変わりありません。よく振って服用して下さい。
- 5.表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

02 登録商標