

ボトックスビスタ注用 50 単位
ボトックスビスタ注用 100 単位
に係る医薬品リスク管理計画書

アッヴィ合同会社

(別紙様式2)

ボトックスビスタ注用 50 単位, ボトックスビスタ注用 100 単位に係る
医薬品リスク管理計画書 (RMP) の概要

販売名	ボトックスビスタ注用50単位 ボトックスビスタ注用100単位	有効成分	A 型ボツリヌス毒素
製造販売業者	アッヴィ合同会社	薬効分類	骨格筋弛緩剤
提出年月日		2026年8月25日	

1.1. 安全性検討事項

【重要な特定されたリスク】	【重要な潜在的リスク】	【重要な不足情報】
<u>過敏症反応(ショック, アナフィラキシー, 血清病を含む)</u>	<u>筋弛緩作用を有する薬剤との相互作用</u>	なし
<u>眼障害</u>		
<u>中和抗体の産生</u>		
<u>神経筋障害を有する患者への投与</u>		
<u>遠隔筋への影響</u>		
<u>痙攣発作</u>		

1.2. 有効性に関する検討事項

なし

↓上記に基づく安全性監視のための活動

2. 医薬品安全性監視計画の概要
通常の医薬品安全性監視活動
<u>副作用, 文献・学会情報及び外国措置報告等の収集・確認</u> <u>・分析に基づく安全対策の検討(及び実行)</u>
追加の医薬品安全性監視活動
なし
3. 有効性に関する調査・試験の計画の概要
なし

↓上記に基づくリスク最小化のための活動

4. リスク最小化計画の概要
通常のリスク最小化活動
<u>添付文書, 患者向医薬品ガイドによる情報提供</u>
追加のリスク最小化活動
<u>本剤の施注資格取得制度の確立</u>
<u>医療従事者向けの資料の作成, 配布</u>
<u>流通管理</u>
<u>失活・廃棄記録の管理</u>




各項目の内容は RMP の本文でご確認下さい。


(別紙様式 1)

医薬品リスク管理計画書

会社名：アッヴィ合同会社

品目の概要			
承認年月日	2009 年 1 月 21 日	薬効分類	871229
再審査期間	5 年 10 ヶ月（2009 年 1 月 21 日から 2014 年 11 月 20 日）効能又は効果① 4 年（2016 年 5 月 23 日から 2020 年 5 月 22 日）効能又は効果②	承認番号	<u>ボトックスビスタ®注用 50 単位</u> 22100AMX00398000 <u>ボトックスビスタ®注用 100 単位</u> <u>30800AMX00315000</u>
国際誕生日	1989 年 12 月 29 日		
販売名	ボトックスビスタ®注用 50 単位、 <u>ボトックスビスタ®注用 100 単位</u>		
有効成分	A 型ボツリヌス毒素		
含量及び剤形	<u>ボトックスビスタ®注用 50 単位</u> ：1 バイアルに A 型ボツリヌス毒素 50 単位を含有する注射 剤 <u>ボトックスビスタ®注用 100 単位</u> ：1 バイアルに A 型ボツリヌス毒素 100 単位を含有する注 射剤		

用法及び用量	眉間の表情皺： 通常，65 歳未満の成人には A 型ボツリヌス毒素として合計 10～20 単位を左右の皺眉筋に各 2 部位（合計 4 部位）及び鼻根筋 1 部位に均等に分割して筋肉内注射する。なお，症状再発の場合には再投与することができるが，3 ヶ月以内の再投与は避けること。 <注射部位> （図 1）  目尻の表情皺： 通常，65 歳未満の成人には A 型ボツリヌス毒素として合計 12-24 単位を左右の眼輪筋の外側に各 3 部位（合計 6 部位）に均等に分割して筋肉内注射する。目尻の表情皺が外眼角の上下にある場合は図 2 のように投与する。 目尻の表情皺が外眼角の下方にある場合は図 3 のように投与する。なお，症状再発の場合には再投与することができるが，3 ヶ月以内の再投与は避けること。 <注射部位> （図 2）  （図 3）  咬筋膨隆： 通常，65 歳未満の成人には A 型ボツリヌス毒素として合計 48～72 単位を左右の咬筋に各 3 部位（合計 6 部位）に均等に分割して筋肉内注射する。なお，症状再発の場合には再投与することができるが，3 ヶ月以内の再投与は避けること。 <注射部位>
--------	--

	(図 4)  耳下腺 咬筋 ラインA 笑筋 投与部位
効能又は効果	ボトックスビスタ®注用 50 単位：65 歳未満の成人における眉間又は目尻の表情皺，65 歳未満の成人における咬筋膨隆 ボトックスビスタ®注用 100 単位：65 歳未満の成人における咬筋膨隆
承認条件	1. 医薬品リスク管理計画を策定の上，適切に実施すること。 2. 本剤についての講習を受け，本剤の安全性及び有効性を十分に理解し，本剤の施注手技に関する十分な知識・経験のある医師によってのみ用いられるよう，必要な措置を講じること。 3. 本剤使用後の安全・確実な失活・廃棄，その記録の適切な保管等，本剤の薬剤管理が適正に行われるよう，所要の措置を講じること。
備考	既存の適応及び承認年月日は下記の通り。 ①眉間の表情皺：2009 年 1 月 21 日 ②目尻の表情皺：2016 年 5 月 23 日 ③咬筋膨隆：2026 年 8 月 24 日 承継年月日：2023 年 8 月 1 日 同一原薬を有する製剤：ボトックス®注用 50 単位，同 100 単位 (製造販売会社：グラクソ・スミスクライン株式会社)

変更の履歴
前回提出日 2025 年 6 月 26 日
変更内容の概要： 1. 品目の概要：「用法及び用量」「効能又は効果」「備考」に「咬筋膨隆」に関する記載を追加 2. 品目の概要：「承認番号」「販売名」「含量及び剤形」「効能又は効果」に「ボトックスビスタ®注用 100 単位」に関する記載を追加 3. 品目の概要：「備考」に承認年月日を追加 4. 医療従事者向けの資料（施注資格登録用：ボトックスビスタ WEB 講習セミナー及び施注資格更新用研修：ボトックスビスタ WEB 講習セミナー資格更新コース）の改訂 5. 重要な特定されたリスクの「過敏症反応（ショック，アナフィラキシー，血清病を含む）」，「眼障害」，「神経筋障害を有する患者への投与」，「遠隔筋への影響」の重要な特定されたリスクとした理由，及び「遠隔筋への影響」の医薬品安全性監視活動選択理由を修正 6. リスク最小化計画の概要（4 項）の「流通管理」及び「失活・廃棄記録の管理」から安全性検討事項を削除 7. 医薬品安全性監視計画の一覧（5.1 項）の通常の医薬品安全性監視活動の記載を医薬品安全性監視計画の概要（2 項）の記載へ修正
変更理由： 1.~4. 「咬筋膨隆」及び「ボトックスビスタ®注用 100 単位」に関する承認事項一部変更承認取得に伴う変更 5.~7. 記載整備

1. 医薬品リスク管理計画の概要

1.1. 安全性検討事項

重要な特定されたリスク	
過敏症反応（ショック，アナフィラキシー，血清病を含む）	
	重要な特定されたリスクとした理由： ・本剤の使用による過敏症反応は稀に報告されている。通常，投与後すぐに発現し，その症状は蕁麻疹等の軽度なことから，顔面又は喉頭の浮腫，喘鳴，失神，息切れ，重度の皮膚障害等の重篤なものまで様々である。 ・本剤は少量の人血清アルブミン（タンパク質）を含有している。理論上は，どんなタンパク質も抗原となる可能性があり，それに対する抗体産生又は細胞応答により患者の感受性が増加する。 ・場合によっては，生命を脅かすような重度のアレルギー反応がみられる<u>ことがある</u>。これまでにアナフィラキシーによる死亡例が1例報告されている。
	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・通常の医薬品安全性監視活動 【選択理由】 ・製造販売後における重篤な副作用に関する情報を収集し，過敏症反応の発現状況をより詳細に把握して，安全性上必要な措置を講じる。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・通常のリスク最小化活動として，以下を実施する。 添付文書の「禁忌」及び「重大な副作用」の項に，本事象について記載する。また，患者向け医薬品ガイドにも関連する事象を記載して注意喚起する。 ・追加のリスク最小化活動として，以下を実施する。 本剤の施注資格取得制度の確立 医療従事者向けの資料の作成，配布 【選択理由】 ・当該副作用発現状況を医療従事者へ提供し，副作用の被害を最小化する。また，医療従事者に対して，適正使用情報資料を作成・配布し，適正使用を推進する。 ・本剤の承認条件である「本剤についての講習を受け，本剤の安全性及び有効性を十分に理解し，本剤の施注手技に関する十分な知識・経験のある医師によってのみ用いられるよう必要な措置を講じること。」を遵守し，安全性の確保を図る。
眼障害	
	重要な特定されたリスクとした理由： ・本剤投与後に眼障害（眼瞼下垂や兔眼など）が発現するリスクがある。眼瞼下垂は，視力障害を来す可能性もある。 ・眼瞼痙攣又は眼の周囲の皮膚の皺に対し，本剤を眼の周囲の筋肉に注射した場合，眼輪筋の筋力低下により閉瞼不全を生じるおそれがあり，これにより，まれに角膜の穿孔又は上皮欠損につながる兔眼や眼球表面の乾燥によって潰瘍を生じるおそれがある。
	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・通常の医薬品安全性監視活動 【選択理由】

	・製造販売後における重篤な副作用に関する情報を収集し、眼障害の発現状況をより詳細に把握し、安全性上必要な措置を講じる。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・通常のリスク最小化活動として、以下を実施する。 添付文書の「用法・用量に関連する使用上の注意」、「重要な基本的注意」、「重大な副作用」の項に、本事象について記載する。また、患者向け医薬品ガイドにも関連する事象を記載して注意喚起する。 ・追加のリスク最小化活動として、以下を実施する。 本剤の施注資格取得制度の確立 医療従事者向けの資料の作成、配布 【選択理由】 ・当該副作用発現状況を医療従事者へ提供し、副作用の被害を最小化する。また、医療従事者に対して、適正使用情報資料を作成・配布し、適正使用を推進する。 ・本剤の承認条件である「本剤についての講習を受け、本剤の安全性及び有効性を十分に理解し、本剤の施注手技に関する十分な知識・経験のある医師によってのみ用いられるよう必要な措置を講じること。」を遵守し、安全性の確保を図る。
中和抗体の産生	
	重要な特定されたリスクとした理由： ・本剤投与後、ボツリヌス毒素の中和抗体が産生されることにより、薬剤耐性が生じる可能性がある。
	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・通常の医薬品安全性監視活動 【選択理由】 ・製造販売後における重篤な副作用に関する情報を収集し、抗体産生の発現状況をより詳細に把握して、安全性上必要な措置を講じる。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・通常のリスク最小化活動として、以下を実施する。 添付文書の「重要な基本的注意」の項に、本事象について記載する。また、患者向け医薬品ガイドにも記載して注意喚起する。 ・追加のリスク最小化活動として、以下を実施する。 本剤の施注資格取得制度の確立 医療従事者向けの資料の作成、配布 【選択理由】 ・当該副作用発現状況を医療従事者へ提供し、副作用の被害を最小化する。また、医療従事者に対して、適正使用情報資料を作成・配布し、適正使用を推進する。 ・本剤の承認条件である「本剤についての講習を受け、本剤の安全性及び有効性を十分に理解し、本剤の施注手技に関する十分な知識・経験のある医師によってのみ用いられるよう必要な措置を講じること。」を遵守し、安全性の確保を図る。
神経筋障害を有する患者への投与	
	重要な特定されたリスクとした理由： ・神経筋接合障害を有する患者は、本剤への感受性が<u>高くなっている</u>可能性があり、過度の筋力低下に至る可能性がある。

	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・ 通常の医薬品安全性監視活動 【選択理由】 ・ 製造販売後における重篤な副作用に関する情報を収集し、神経筋障害として報告された副作用（重症筋無力症又はイートン・ランバート症候群等）の発現状況を詳細に把握し、安全性上必要な措置を講じる。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・ 通常のリスク最小化活動として、以下を実施する。 添付文書の「禁忌」の項に、本事象について記載する。また、患者向け医薬品ガイドにも記載して注意喚起する。 ・ 追加のリスク最小化活動として、以下を実施する。 本剤の施注資格取得制度の確立 医療従事者向けの資料の作成、配布 【選択理由】 ・ 当該副作用発現状況を医療従事者へ提供し、副作用の被害を最小化する。また、医療従事者に対して、適正使用情報資料を作成・配布し、適正使用を推進する。 ・ 本剤の承認条件である「本剤についての講習を受け、本剤の安全性及び有効性を十分に理解し、本剤の施注手技に関する十分な知識・経験のある医師によってのみ用いられるよう必要な措置を講じること。」を遵守し、安全性の確保を図る。
遠隔筋への影響	
	重要な特定されたリスクとした理由： ・ <u>投与筋以外の遠隔筋</u>への毒素拡散に関連する副作用が報告されており、嚥下障害、肺炎、重度の衰弱に伴う死亡例も報告されている。
	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・ 通常の医薬品安全性監視活動 【選択理由】 ・ 製造販売後における重篤な副作用に関する情報を収集し、<u>遠隔筋</u>への毒素拡散に関連する副作用の発現状況を詳細に把握し、安全性上必要な措置を講じる。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・ 通常のリスク最小化活動として、以下を実施する。 添付文書の「警告」、「重要な基本的注意」及び「過量投与」の項に、本事象について記載する。また、患者向け医薬品ガイドにも記載して注意喚起する。 ・ 追加のリスク最小化活動として、以下を実施する。 本剤の施注資格取得制度の確立 医療従事者向けの資料の作成、配布 【選択理由】 ・ 当該副作用発現状況を医療従事者へ提供し、副作用の被害を最小化する。また、医療従事者に対して、適正使用情報資料を作成・配布し、適正使用を推進する。 ・ 本剤の承認条件である「本剤についての講習を受け、本剤の安全性及び有効性を十分に理解し、本剤の施注手技に関する十分な知識・経験のある医師によってのみ用いられるよう必要な措置を講じること。」を遵守し、安全性の確保を図る。

痙攣発作	
	重要な特定されたリスクとした理由： ・主として痙攣発作の素因のある患者において、本剤投与後に新規の痙攣発作あるいはその再発が報告されている。
	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・通常の医薬品安全性監視活動 【選択理由】 ・製造販売後における重篤な副作用に関する情報を収集し、痙攣発作に関連する副作用の発現状況を詳細に把握し、安全性上必要な措置を講じる。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・通常のリスク最小化活動として、以下を実施する。 添付文書の「重大な副作用」の項に、本事象について記載する。また、患者向け医薬品ガイドにも関連する事象を記載して注意喚起する。 ・追加のリスク最小化活動として、以下を実施する。 本剤の施注資格取得制度の確立 医療従事者向けの資料の作成、配布 【選択理由】 ・当該副作用発現状況を医療従事者へ提供し、副作用の被害を最小化する。また、医療従事者に対して、適正使用情報資料を作成・配布し、適正使用を推進する。 ・本剤の承認条件である「本剤についての講習を受け、本剤の安全性及び有効性を十分に理解し、本剤の施注手技に関する十分な知識・経験のある医師によってのみ用いられるよう必要な措置を講じること。」を遵守し、安全性の確保を図る。

重要な潜在的リスク	
筋弛緩作用を有する薬剤との相互作用	
	重要な潜在的リスクとした理由： ・アミノグリコシド系抗生物質，スペクチノマイシンあるいは神経筋伝達を阻害する他の薬剤により，ボツリヌス毒素作用を増強することがある。
	医薬品安全性監視活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・通常の医薬品安全性監視活動 【選択理由】 ・製造販売後における重篤な副作用に関する情報を収集し，筋弛緩作用を有する薬剤との相互作用に関連する副作用の発現状況を詳細に把握し，安全性上必要な措置を講じる。
	リスク最小化活動の内容及びその選択理由： 【内容】 ・通常のリスク最小化活動として，治療期間中及び事象発現時に注意すべき事項を添付文書の「相互作用」の項に記載し，注意喚起する。また，患者向け医薬品ガイドにも記載して注意喚起する。 ・追加のリスク最小化活動として，以下を実施する。 - 本剤の施注資格取得制度の確立 - 医療従事者向けの資料の作成，配布 【選択理由】 ・当該副作用発現状況を医療従事者へ提供し，副作用の被害を最小化する。また，医療従事者に対して，適正使用情報資料を作成・配布し，適正使用を推進する。 ・本剤の承認条件である「本剤についての講習を受け，本剤の安全性及び有効性を十分に理解し，本剤の施注手技に関する十分な知識・経験のある医師によってのみ用いられるよう必要な措置を講じること。」を遵守し，安全性の確保を図る。

重要な不足情報
該当なし

1.2. 有効性に関する検討事項

該当なし

2. 医薬品安全性監視計画の概要

通常 of 医薬品安全性監視活動
通常 of 医薬品安全性監視活動 of 概要： 副作用，文献・学会情報及び外国措置報告等の収集・確認・分析に基づく安全対策 of 検討（及び実行）
追加 of 医薬品安全性監視活動
該当なし

3. 有効性に関する調査・試験の計画の概要

該当なし

4. リスク最小化計画の概要

通常のリスク最小化活動	
通常のリスク最小化活動の概要： 添付文書，患者向医薬品ガイドによる情報提供。	
追加のリスク最小化活動	
本剤の施注資格取得制度の確立	
	【安全性検討事項】 「過敏症反応」，「眼障害」，「中和抗体の産生」，「神経筋障害を有する患者への投与」，「遠隔筋への影響」，「痙攣発作」，「筋弛緩作用を有する薬剤との相互作用」 【目的】 本剤の承認条件である「本剤についての講習を受け，本剤の安全性及び有効性を十分に理解し，本剤の施注手技に関する十分な知識・経験のある医師によってのみ用いられるよう必要な措置を講じること。」を遵守し，安全性の確保を図る。 【具体的な方法】 ・本剤を使用する医師は Web 講習を受講し，施注資格を取得することを必須とする。 ・本剤を出荷する際，医師の施注資格の有無確認を必須とし，資格未取得の医師には本剤を出荷しない。 ・施注資格は定期的な更新を必須とし，更新時にも医師は Web 講習を受講する。 ・用いる資材は以下の通り ・施注資格登録用：ボトックスビスタ WEB 講習セミナー ・施注資格更新用研修：ボトックスビスタ WEB 講習セミナー資格更新コース 【節目となる予定の時期，実施した結果に基づき採択される可能性がある更なる措置】 医薬品リスク管理計画に関する評価報告書の提出時（毎年 7 月提出）において，本剤を使用する医師の施注資格取得・更新状況及び安全性検討事項について確認する。本結果から，リスク最小化策の更なる強化が必要と判断される場合，また新たな安全性検討事項が認められた場合には，講習内容の変更，実施方法の改訂等を検討する。 報告の予定時期：医薬品リスク管理計画に関する評価報告書の提出時（毎年 7 月提出）
医療従事者向けの資料の作成，配布	
	【安全性検討事項】 「過敏症反応」，「眼障害」，「中和抗体の産生」，「神経筋障害を有する患者への投与」，「遠隔筋への影響」，「痙攣発作」，「筋弛緩作用を有する薬剤との相互作用」 【目的】 医療従事者に対して，適正使用情報資材を作成・配布し，適正使用を推進する。 【具体的な方法】 ・納入時に，適正使用情報を提供，説明し，資材の活用を依頼する。企業ホームページに掲載する。また下記の資料について医療従事者に提供する。 ・施注資格登録用：ボトックスビスタ WEB 講習セミナー ・施注資格更新用研修：ボトックスビスタ WEB 講習セミナー資格更新コース 【節目となる予定の時期，実施した結果に基づき採択される可能性がある更なる措置】 医薬品リスク管理計画に関する評価報告書の提出時（毎年 7 月提出）において，副作用発現状況等本剤の適正使用状況を確認する。本結果から，リスク最小化策の更なる強化が必要と判断される場合，また新たな安全性検討事項が認められた場合には，資材の改訂等を検討する。 報告の予定時期：医薬品リスク管理計画に関する評価報告書の提出時（毎年 7 月提出）

流通管理	
	【目的】 本剤の承認条件である「本剤についての講習を受け、本剤の安全性及び有効性を十分に理解し、本剤の施注手技に関する十分な知識・経験のある医師によってのみ用いられるよう必要な措置を講じること。」を遵守し、安全性の確保を図る。 【具体的な方法】 ・本剤を出荷する際、医師の施注資格の有無確認を必須とし、資格未取得の医師には本剤を出荷しない。 【節目となる予定の時期、実施した結果に基づき採択される可能性がある更なる措置】 医薬品リスク管理計画に関する評価報告書の提出時（毎年 7 月提出）において、本剤を使用する医師の施注資格取得・更新状況及び出荷先について確認する。本結果から、リスク最小化策の更なる強化が必要と判断される場合、また新たな安全性検討事項が認められた場合には、実施方法の変更等を検討する。 報告の予定時期：医薬品リスク管理計画に関する評価報告書の提出時（毎年 7 月提出）
失活・廃棄記録の管理	
	【目的】 ・本剤の承認条件である「本剤使用後の安全・確実な失活・廃棄、その記録の適切な保管等、本剤の薬剤管理が適正に行われるよう、所要の措置を講じること。」を遵守し、適正使用の確保を図る。 【具体的な方法】 本剤の出荷先に対し、失活・廃棄の記録（「管理の記録」）を依頼し、毎年その記録を回収し、実施状況を確認する。 【節目となる予定の時期、実施した結果に基づき採択される可能性がある更なる措置】 医薬品リスク管理計画に関する評価報告書の提出時（毎年 7 月提出）において、失活・廃棄の記録状況を確認する。本結果から、リスク最小化策の更なる強化が必要と判断される場合には、実施方法の変更等を検討する。 報告の予定時期：医薬品リスク管理計画に関する評価報告書の提出時（毎年 7 月提出）

5. 医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・試験の計画及びリスク最小化計画の一覧

5.1. 医薬品安全性監視計画の一覧

通常 of 医薬品安全性監視活動				
副作用、文献・学会情報及び外国措置報告等の収集・確認・分析に基づく安全対策の検討（及び実行）				
追加 of 医薬品安全性監視活動				
追加 of 医薬品安全性監視活動の名称	節目となる症例数/目標症例数	節目となる予定の時期	実施状況	報告書の作成予定日
該当なし				

5.2. 有効性に関する調査・試験の計画の一覧

有効性に関する調査・試験の名称	節目となる症例数/目標症例数	節目となる予定の時期	実施状況	報告書の作成予定日
該当なし				

5.3. リスク最小化計画の一覧

通常 of リスク最小化活動		
添付文書、患者向医薬品ガイドによる情報提供。		
追加 of リスク最小化活動		
追加 of リスク最小化活動の名称	節目となる予定の時期	実施状況
本剤の施注資格取得制度の確立	医薬品リスク管理計画に関する評価報告書の提出時（毎年 7 月提出）	実施中
医療従事者向けの資料の作成，配布	医薬品リスク管理計画に関する評価報告書の提出時（毎年 7 月提出）	実施中
流通管理	医薬品リスク管理計画に関する評価報告書の提出時（毎年 7 月提出）	実施中
失活・廃棄記録の管理	医薬品リスク管理計画に関する評価報告書の提出時（毎年 7 月提出）	実施中