

リンヴォック®を 服用される方へ

このカードには、リンヴォック®の服用前及び服用中に
注意すべき重要な安全性情報が記載されています。

このカードを常に携帯してください。

あなたの治療に関わる情報を主治医または緊急治療に
関わる医師と共有することが大切です。

リンヴォック®主治医以外の医師を受診する時

このカードを主治医以外の医師に提示して、リンヴォック®を服用していることを
医師に伝えてください。

感染症(重篤な感染症を除く)、結核けっかくの既往感染者きおうかんせんしゃ、静脈血栓塞栓症じょうみやくけっせんそくせんしゅう、B型肝炎びーがたかんえん
ウイルスキャリアまたは既往感染者きおうかんせんしゃ、腸管憩室ちようかんけいしつ、間質性肺炎かんしつせいはいえん、好中球数減少、
リンパ球数減少、ヘモグロビン値減少、腎機能障害、肝機能障害の基礎疾患が
ある場合、または高齢者では、安全性上のリスクが高くなる可能性があります。

主治医の名前：

医療機関の電話番号：

リンヴォック®を開始した日：

本資材は、医薬品リスク管理計画に基づく内容を含む資材であり、追加のリスク最小化活動に
該当するページにRMPマークを付与しています。

服用中に注意をしていただきたいこと

リンヴォック®の服用中は継続的な観察が必要となります。副作用
ならびに体調の変化を感じた場合は、医師に報告してください。

1 感染症のリスク

リンヴォック®は、結核、帯状疱疹、ウイルス性肝炎など、既存の感染症を悪化させたり、新たな感染症にかかる可能性を高くしたりすることがあります。以下のような感染症の徴候がみられた場合には、速やかに医師にお知らせください。

- 発熱、発汗、悪寒、体重減少、または持続する咳—これらは結核の徴候の可能性がありま
- す。
- 水疱、痛みを伴う皮疹—帯状疱疹の徴候の可能性がありま
- す。
- 疲労感または息切れ—肺炎の徴候の可能性がありま
- す。

次の場合は医師に伝えてください。

- 最近結核と診断された、または結核にかかったことがある。
- 同居家族が結核にかかった。あるいは最近、結核にかかっている人と頻繁に会った、または長時間一緒に過ごした。

2 深部静脈血栓症または肺塞栓症

静脈または肺に血栓が生じる可能性があります。痛みを伴う脚の腫れ、息切れ、胸痛などの徴候がみられた場合には、速やかに医師にご相談ください。

3

どうみやくけっせんそくせんしょう

動脈血栓塞栓症

動脈に血栓が生じる可能性があります。突然の胸の痛み、冷感、皮膚の色の変化、しびれや麻痺、または手足の脱力感などの徴候がみられた場合には、速やかに医師にご相談ください。

4

しょうかかんせんこう

消化管穿孔

腹部に激しい痛み、嘔気・嘔吐、食欲不振などの症状が現れることがあります。特にリンヴォック®をクローン病に使用した際には注意が必要です。これらの症状が現れた場合には、医師にご相談ください。

5

肝機能障害

倦怠感、食欲の低下、皮膚などが黄色になる「黄疸」^{おうだん}が現れることがあります。これらの症状が現れた場合には、医師にご相談ください。
稀ではありますが、^{びーがたかんえん}B型肝炎ウイルスの再活性化も報告されています。

6

かんしつせいはいえん

間質性肺炎

発熱、痰を伴わない空咳^{からせき}、呼吸困難などの症状が現れることがあります。これらの症状が現れた場合には、医師にご相談ください。

7

血液検査値の異常

好中球数減少、リンパ球数減少、ヘモグロビン値減少が現れることがあります。発熱、咽頭痛^{いんどうつう}などの感染を疑う症状、めまい、疲労感などの貧血を疑う症状が現れることがあります。これらの症状が現れた場合には、医師にご相談ください。

8 かびんしょう 過敏症

顔、首、唇、舌などの急な腫れ、息苦しさ、かゆみ、じんま疹などがみられた場合には、速やかに医師にご相談ください。

9 あくせいしゅよう 悪性腫瘍

臨床試験において皮膚の悪性腫瘍^{あくせいしゅよう}を含め悪性腫瘍^{あくせいしゅよう}の発現が報告されています。定期的に皮膚の状態も含めて確認いただき、異常を感じた場合には医師にご相談ください。

10 しんけっかんけいじしょう 心血管系事象（コレステロール）

脂質の一種であるコレステロール（総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪など）の上昇により、心筋梗塞^{しんきんこうそく}などのリスクとなる場合があります。前胸部に強い痛み、締めつけ感、あるいは突然の顔・手足のしびれ（特に右側だけ、左側だけといった片側に起こった場合）、脱力感が現れた場合には、医師にご相談ください。

11 おうもんきんゆうかいしょう 横紋筋融解症、ミオパチー

筋肉障害に関連する酵素^{こうそ}（血中クレアチンホスホキナーゼ：CPK）が増加することがあります。リンヴォック®服用中は筋肉痛、しびれなどの症状が現れることがあります。これらの症状が現れた場合には、医師にご相談ください。

12 腎機能障害

倦怠感、食欲不振、皮膚のかゆみなどの症状が現れることがあります。これらの症状が現れた場合には、医師にご相談ください。

服用前から注意をしていただきたいこと

感染予防に使用されるワクチン

リンヴォック®の服用前または服用中に生ワクチン「たいじょうほうしん帯状疱疹（水痘）、ふうしんはしか/おたふく風邪/風疹など」は投与できません。ワクチンを接種する場合には主治医に相談してください。

避妊、妊娠、授乳

リンヴォック®は妊娠中または妊娠の可能性のある場合は服用できません。

- リンヴォック®の最終服用後1月経周期は、効果的な避妊を実施してください。
- 妊娠を希望される場合、あるいは妊娠された場合は、速やかに主治医にお伝えください。
- リンヴォック®の服用中は授乳しないことを推奨します。すいしゅう

服用する時に注意をしていただきたいこと

リンヴォック®は、薬の成分が少しずつ放出されるタイプじょうざいの錠剤です。ご使用の際には、かみ砕くことなくそのまま服用してください。

服用する時に注意が必要な薬

薬剤の代謝酵素たいしやくそうそに影響を及ぼす薬を服用されている場合には、リンヴォック®の作用が強くなったり、弱くなったりすることがあります。

一緒に服用している薬について、医師または薬剤師に伝えてください。

関節リウマチの治療を受けている患者さんへ

関節リウマチでは、患者さんと主治医が具体的な治療目標と目標達成までの期間を一緒に決めて、治療を行っていく“目標達成に向けた治療(Treat to Target)”が推奨^{すいしょう}されています¹⁾。

右二次元バーコード先にある「関節リウマチにおける
Treat to Target^{じっせん}実践ガイド」から患者さんが知っておくべきことや、主治医とのコミュニケーションのポイントをご確認いただけます。



1) Smolen JS, et al: Ann Rheum Dis, 69, 4: 631-637(2010).

製造販売元

アッヴィ合同会社
東京都港区芝浦3-1-21

[文献請求先及び問い合わせ先]
くすり相談室
フリーダイヤル 0120-587-874

2025年6月作成
JP-RNQ-190001-6.0

abbvie