


クービビック[®]錠を 服用される患者さんへ

このお薬は眠りやすくするお薬です。
翌日まで眠気が残る場合には、医師または薬剤師
などにご相談ください。



<服用の仕方について>

- ▲ 寝る直前に服用してください。
- ▲ いったん寝たあと、短時間後にまた起きて仕事などをする必要があるときは、服用しないでください。
- ▲ 効果が強くなりすぎる可能性があるため、お薬をアルコールと一緒に服用する際は注意が必要です。
- ▲ 食事と同時または食事の直後には、服用しないでください(効果の発現が遅くなり、効果が弱くなる可能性があります)。
- ▲ ご自身の判断で、お薬の量を変えたり、服用をやめず、医師にご相談ください。
- ▲ 服用し忘れても、1度に2回分を服用しないでください。



クービビック[®]錠

通常、1日1回50mgを寝る直前に服用します。
状態に応じて、1日1回25mgが処方されることもあります。



25mg錠



50mg錠

<服用に際しての注意>

- ▲ 重度の肝機能障害のある方は服用できません。肝機能に問題がある場合は医師にご相談ください。
- ▲ 車の運転など、危険を伴う機械の操作はしないでください。
- ▲ お薬を他の人に譲り渡さないでください。
- ▲ 副作用があらわれやすくなったり、強くなることがあるためクービビック®錠と一緒に服用することができないお薬や、一緒に服用するとクービビック®錠の効き方に影響があるお薬があります。他のお薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師などにご相談ください。

一緒に服用することができないお薬

- イトラコナゾール(イトリゾール)
- クラリスロマイシン(クラリス、クラリシッド)
- ポリコナゾール(ブイフェンド)
- ポサコナゾール(ノクサフィル)
- リトナビル含有製剤(カレトラ、ノービア、パキロビッド)
- コビシタット含有製剤(シムツーズ、ゲンボイヤ、プレジコビックス)
- セリチニブ(ジカディア)
- エンシトレルビル フマル酸(ゾコーバ)



服用中に困った症状があらわれた場合は、
医師または薬剤師などにご相談ください。

クービビック®錠を服用している間、下記のような症状が出る場合があります。



昼間

- 眠気がある(刺激がないと眠ってしまう)
- 急に力が抜ける(立っていられなかったり、物を落としたりする)