

過敏症を注意するカード（患者カード）

(表面)

RMP

# CAUTION

## トリーメク配合錠 を服用する患者さんへ

※ このカードは必ず常に携帯してください。

ヴィーブヘルスケア株式会社

(中面)

アバカビルを成分として含むくすりを服用すると、かひんしやう過敏症が起こる場合があります。

過敏症が発現した患者さんがアバカビルを成分として含むくすりの服用を続けると、生命にかかわる重大な事態となる場合があります。

次のような場合は、ただちに担当医師に連絡し、服用を中止するべきかどうか指示を受けてください。

**1.発疹はっしんが起こった場合**

**2.下記の4つのグループのうち2つ以上のグループにあてはまる症状が起こった場合**

- ・発熱
- ・吐き気、嘔吐おうと、下痢、腹痛
- ・ねむけ、倦怠感けんたいかん、筋肉や関節の痛み、頭痛
- ・息切れ、のどの痛み、せき

このような<sup>かひんしやう</sup>過敏症のためにこのくすりの服用を中止した場合は、**その後絶対にアバカビルを成分として含むくすりを服用しないでください。**

このような<sup>かひんしやう</sup>過敏症を経験した人がこのくすりを再び服用すると、数時間以内により強い<sup>かひんしやう</sup>過敏症の症状があらわれ、生命にかかわるほどの<sup>けつあつていさ</sup>血圧低下が発現したり、死に至るおそれがあります。

(裏面)

※ このカードは必ず常に携帯してください。

**あなたの担当医師の電話番号**

病院・医院名： \_\_\_\_\_

診療科名： \_\_\_\_\_

担当医師名： \_\_\_\_\_ TEL ( \_\_\_\_\_ )

担当医師名： \_\_\_\_\_ TEL ( \_\_\_\_\_ )

**先生方へ** 重篤な症状が発現した場合には、血管ならびに気道等を確保した上で血圧及び呼吸の管理につとめ、経過観察を行うなどの一般的な対症療法を実施してください。

TRANPCR0200001-P2011N 作成年月2020年11月