

デエビゴ錠を 服用される患者さんへ

このお薬は不眠症の治療薬です。

デエビゴ錠を服用する時の注意

- このお薬は眠りやすくするお薬で、翌日まで眠気が残る可能性があります。飲む量を増やすと眠気が起こりやすくなるので、増量したあとは特に注意してください。
- 寝る直前に服用してください。
- 食事と同時または食事の直後には、服用しないでください（効果の発現が遅くなり、効果が弱くなる可能性があります）。
- お薬を服用する際は、アルコールと一緒にのまないでください。
- ご自身の判断で、お薬の量を変えたり、服用を中止したりせずに、必ず主治医に相談してください。
- お薬の影響が服用の翌朝以降に及ぶことがありますので、車の運転など、危険を伴う機械の操作はしないでください。
- お薬を他の人に譲り渡さないでください。
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他のお薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。



注意すべき薬剤の例

- イトリゾール®(イトラコナゾール)
- クラリシッド®、クラリス®(クラリスロマイシン)
- エリスロシン®(エリスロマイシン)
- ジフルカン®(フルコナゾール)
- ワソラン®(ベラパミル) 等

()内は一般名

こんな症状があったら先生に相談してください



デエビゴ錠を服用している間、下記のような症状が出る場合があります。このような症状が現れたら、主治医の先生に相談してください。

日中

- 眠気がある
(刺激がないと眠ってしまう)



- 急に力が抜ける
(立ってられなかったり、物を落としたりする)



夜間

- 寝る前後や起きた直後に、体を動かそうとしても動かなくなる(金縛り)



- 眠っている最中に起き上がって活動し、翌日その出来事を覚えていない



- 幻覚(本来あるはずのないものが現れたり、聞こえたりする)がある



病医院名・薬局名