


サムタス[®]点滴静注用を 使用される患者さんおよび ご家族(介護者)の方へ

サムタス[®]
使用時の注意点です。



監修

かわぐち心臓呼吸器病院
内科統括部長・循環器内科部長・副院長
佐藤 直樹 先生



Otsuka 大塚製薬株式会社

サムタスを使用される患者さん およびご家族(介護者)の方へ

このお薬は、
体にたまった余分な水分を排泄することで、
むくみを取り除くお薬です。
入院をして血液の検査、
体内の水分の調整をしながら、
副作用の確認をします。
医師の監視のもと使用されますが、
気をつけていただきたいことがありますので、
こちらの冊子を
参考にしてください。



医師の診察が必要な症状があり

次のような症状がある場合は、速やかに医師の診察を受け

脱水症状が疑われるとき

- のどが渇き、水を飲んでも良くならない
- 皮膚の乾きが急に目立ってきた

高ナトリウム血症が疑われるとき

- 口が渇く
- 水をたくさん飲んでしまう
- けいれん
- 頭痛
- 嘔吐
- 体がだるい
- 意識がなくなる、意識が乱れる



血清ナトリウム濃度が急激に上昇することによる 障害*が疑われるとき

しんとうあつせいだつずいしょうこうぐん
*浸透圧性脱髄症候群

- 手足のまひ
- 発声が不明瞭になる
- 飲み込みにくい
- けいれん
- 意識がなくなる、意識が乱れる

ます!

てください。

高カリウム血症が疑われるとき*

- 口のまわりがしびれる
- 胸が苦しい
- 体がだるい

*不整脈が発現するまで自覚症状が乏しい場合も多い

肝機能の障害が疑われるとき

- 強いだるさを感じた
- 吐き気を感じたり食欲が低下した
- 皮膚や白目が黄色くなった
- 尿が茶褐色になった



心不全症状の悪化が疑われるとき

- むくみが強くなった
- 呼吸が苦しくなった
- めまい、立ちくらみがおこった



ここにあげたこと以外にも、
**お薬の使用を開始してから体に異常を感じたら、
速やかに医師の診察を受けてください。**

ご家族(介護者)の方へ

サムタスを使用される患者さんによりよい治療を行っていたまとめました。

- このお薬には併用を注意すべきお薬があります。他のお薬を使用している場合や新たにお薬を使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- 妊婦、妊娠する可能性のある人、授乳中の人は、赤ちゃんに影響が出てしまう可能性があるので医師にご相談ください。
- めまい、立ちくらみがあらわれることがあるので、転倒に注意してください。また、高いところでの作業や自動車の運転等、危険を伴う機械を操作する際には注意してください。
- 医師より塩分制限などの食事管理の指導があった場合は、食事管理にご協力をお願いします。詳しくは医師にご相談ください。
- このお薬を使用すると、尿量が増えて、のどが渇くことがよくあります。そのような場合には、水分を補給してください。詳しくは医師にご相談ください。

だくために、ご家族の方にご注意いただきたいポイントを

- 脱水症状や血液中のナトリウム及びカリウム濃度の上昇や肝機能障害などの副作用を防ぐため、治療中は頻回に血液検査を行います。ご協力をお願いいたします。
- いつもより飲水量が目立って増加した、皮膚や唇・口の中の乾燥が目立つ、むくみが強い、呼吸が苦しそう、めまいや立ちくらみがあるなど、普段と様子が違うことに気付かれた場合は、医師の診察を受けるようにしてください。
- 強い倦怠感が出る、吐き気を催す、食欲が低下した、皮膚や白目が黄色くなった、尿が茶褐色になったなどに気付かれた場合は、医師の診察を受けるようにしてください。

医療機関名



Otsuka 大塚製薬株式会社

RMP資材
2025年3月改訂
SI2502004
(0010684)IN