

●下記のような症状があらわれたら、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような場合には、服用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

1. 倦怠感、食欲不振、嘔吐 [重篤な肝機能障害、自己免疫性肝炎]
2. めまい、のどの痛み、出血しやすい、疲れやすい、顔やまぶたの裏が白っぽい [汎血球減少、白血球減少、好中球減少、血小板減少、貧血（ヘモグロビン減少）]
3. 急激な体重増加、全身のむくみ、息切れ、動悸 [心不全、うっ血性心不全]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状があらわれた場合は、主治医または薬剤師に相談してください。

医療機関名

ボセンタン錠62.5mg「サワイ」を服用されている方へ

このお薬は以下の効果が期待されます。

- ・肺動脈性肺高血圧症における肺動脈圧の降下
- ・全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制

この説明書は、このお薬の大切な注意事項ですので、よくお読みになり、必ず注意事項をお守りください。

注意事項


- 主治医や薬剤師の指示をしっかりと守って服用してください。
- このお薬について、次の事項を必ずお守りください。

- 1 胎児に影響を与えるおそれがあります。このお薬を飲んでいる間は妊娠しないよう十分注意してください。服用中は経口避妊薬の効果が低下する可能性がありますので、経口避妊薬単独での避妊を避け、別の避妊法を併用してください。妊娠する可能性のある女性は、服用前・服用中は毎月妊娠検査を必ず受けてください。また、授乳している人は主治医に相談してください。

2 このお薬は肝臓の機能を損なうことがありますので、服用前及び服用中も毎月1回は肝機能の検査が行われます。服用開始後3ヵ月間は2週間に1度の検査が望ましいとされています。受診日を守ってください。

3 このお薬は貧血や血小板減少、白血球減少等を起こすことがありますので、服用前と服用開始後4ヵ月間は毎月、その後は3ヵ月に1回、血液検査を受けてください。

4 心臓に病気のある人で急に体重が増えた場合は、心不全の可能性があるので、主治医または薬剤師に相談してください。



5 グレープフルーツジュースはこのお薬の副作用を起こりやすくするおそれがあるので、お薬と一緒にグレープフルーツジュースを飲まないでください。また、セイヨウオトギリソウはこのお薬の効果を弱くするおそれがあるので、セイヨウオトギリソウを含有する食品は、控えてください。

6 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分をとばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。

7 誤って多く飲んだ場合、頭痛が起こる可能性があります。異常を感じたら主治医または薬剤師に相談してください。

8 主治医の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

9 このお薬はめまいを起こすことがあるので、自動車の運転及び危険を伴う機械の操作には十分注意してください。



●このお薬を服用した後、気をつけていただくこと

1 主な副作用として、頭痛、倦怠感、筋痛、めまい、動悸、ほてり、潮紅、血圧低下、背部痛、下肢浮腫、疲労などが報告されています。このような症状に気づいたら、主治医または薬剤師に相談してください。

2 服用中に、万が一妊娠した可能性があると考えられた場合、直ちに受診してください。