

医薬品リスク管理計画 (RMP)
本資料は医薬品リスク管理計画に基づき作成された資料です

ベオビユ®
硝子体内注射用キット120mg/mL
 による治療を受ける患者さまへ

※このカードは携帯してください。
 ※目の違和感(中面に記載)を感じたら、
 すぐに担当医に連絡してください。

NOVARTIS
 ノバルティス ファーマ株式会社

表面

ベオビユの施術後、副作用が出る場合があります。


特に注意したい副作用

眼内炎、眼内炎症(ぶどう膜炎等)、網膜色素上皮裂孔、網膜剥離、網膜裂孔、網膜動脈閉塞、網膜血管炎、網膜血管閉塞、眼圧上昇

施術後に注意いただきたい主な症状

- 目のかすみ
- 視力の低下(を感じる)
- 目の痛みや不快感
- 目やに
- 眼充血の悪化
- まぶたや目の周囲の腫れ
- 黒い点が見える(飛蚊症)
- まぶしく感じる

ベオビユによる
 治療ガイド(音声)は
 こちらから



担当医の指示をよく守り、いつもと違う症状が
 現れたら、すぐに担当医に連絡してください。

中面

通院している医療機関

医療機関名：
 連絡先：
 医師名：

投与日	20 年	20 年	20 年	20 年	20 年
	/	/	/	/	/

※診察時に先生にお渡しください。
 BE000001ZK0002

2023年5月作成

裏面