

ゾコーバ[®]錠125mgを処方された女性の患者さんとご家族のみなさまへ

妊娠している女性又は妊娠している可能性のある女性はこのおくすりを服用できません。

このおくすりは、動物実験で、ウサギの胎児に催奇形性が認められており、人での影響はわかつていませんが、妊娠中に服用することで、胎児奇形を起こす可能性があります。

- 現在、妊娠中又は妊娠している可能性がある場合には、このおくすりを服用できません。少しでも可能性がある場合は、必ず医師、薬剤師又は看護師にお伝えください。
 - 前回の月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性があります。**避妊をしていても妊娠していないとは限りません。**
 - 妊娠初期の妊婦では、妊娠検査で陰性を示す場合があります。
 - 実際に、このおくすりを服用した後で妊娠していたことがわかった事例があります。
- 妊娠する可能性のある女性は、このおくすりを服用中及び最終服用後2週間以内に性交渉を行う場合は、パートナーと共に適切な避妊を行ってください。
- このおくすりを服用中及び最終服用後2週間における妊娠が判明した、あるいは疑われる場合には、直ちに服用を中止して医師、薬剤師又は看護師に相談してください。
- 万が一、服用開始後に妊娠が判明した場合には、妊娠と薬情報センターでのご相談が可能です。相談申し込みの詳しい手順についてはお問い合わせください(0120-41-24-93、受付時間 月～金曜日10:00-12:00、13:00-16:00)。もしくは近隣の産婦人科医にご相談ください。
- 症状が良くなつた場合でも5日間飲み切つてください。
 - 万が一、おくすりが残つてしまつた場合でも絶対に他の人に譲らないでください。
 - 残つたおくすりは保管せず、患者さん自身で廃棄又は薬剤師にお渡ししてください。
 - 副作用等で中止する場合は医師、薬剤師又は看護師に相談してください。

妊娠と薬情報センターはこちら



SHIONOGI

製造販売元【文献請求先及び問い合わせ先】

塩野義製薬株式会社

大阪市中央区道修町3-1-8

医薬情報センター TEL 0120-956-734

RMP

XCV-C-0014(V05)
審360551
2025年11月作成

ゾコーバ[®]錠125mg(以下:本剤)を 服用する際の事前チェックリスト

説明者と患者さんで、以下の項目を必ず確認してください

● 本剤服用前の注意事項

**妊娠している女性又は妊娠している可能性のある女性は
本剤を服用できません。**

- 本剤は、妊娠中に服用することで、胎児奇形を起こす可能性があります。
- 前回の月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性があります。
 避妊をしていても妊娠している可能性があります。
 - 妊娠初期には、妊娠検査薬で陰性を示す場合があります。

**少しでも妊娠の可能性がある場合は、
必ず医師、薬剤師又は看護師に申し出てください。**

- ① 現在、妊娠していますか？

妊娠している

妊娠していない

- ② 前回の月経以降、性交渉しましたか？

した

していない

● 本剤服用中～服用終了後の注意事項

- ③ 本剤を服用中及び最終服用後2週間以内に性交渉を行う場合は、
パートナーと共に適切な避妊を行ってください。

避妊が必要な期間は、20 年 月 日までです。

確認しました

- ④ 本剤を服用中及び最終服用後2週間ににおける妊娠が判明した、あるいは
疑われる場合には、直ちに服用を中止して医師、薬剤師又は看護師に相談
してください。

確認しました

- ⑤ 症状が良くなった場合でも5日間飲みきってください。
– 副作用等で中止する場合は医師、薬剤師又は看護師に相談してください。
– 万が一、薬が残った場合には、他の方に譲り渡すことなく廃棄してください。

確認しました



SHIONOGI