医薬品リスク管理計画
(RMP)

本資材は医薬品リスク管理計画に基づき作成された資材です

コレクチム®軟膏 0.5%・0.25%を お使いになる患者さま および保護者の方へ

必ずお読みください

コレクチム®軟膏（一般名：デルゴシチニブ）は，
外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤と呼ばれる
アトピー性皮膚炎の治療薬です。
この薬は，ステロイド外用薬等の塗り薬とは異なる機序で作用し，
ヤヌスキナーゼファミリー（JAK1，JAK2，JAK3およびTyk2）の
すべてのキナーゼ活性を阻害することにより，皮膚の炎症を抑制します。

必ずお守りください

過去に,この薬に含まれる成分で過敏症のあった方は,
この薬を使用することはできません。

この薬の使い方

● 使い方や使う量は，医師・薬剤師の指示に従ってください。

【成人】通常，0.5%製剤を1日2回，適量を患部に塗ります。
1回に塗る量は，5g(5g チューブ1本，または10g チューブ1/2本)までです。

【小児】通常，0.25%製剤を1日2回，適量を患部に塗ります。
症状に応じて，0.5%製剤を1日2回塗ることができます。
1回に塗る量は，5g(5g チューブ1本，または10g チューブ1/2本)までですが，体格を考慮してください。
また，0.5%製剤で症状が改善した場合は，0.25%製剤に切り替えることがあります。薬の切り替えについては，医師・薬剤師の指示に従ってください。

※6ヵ月以上2歳未満の小児の臨床試験では，1回に塗る量が，2.5g(5g チューブ1/2本，または10g チューブ1/4本)までしか使用経験はありません。

※低出生体重児，新生児および6ヵ月未満の乳児に対する安全性は確立していません。

※1回に塗る量は体表面積の30%までを目安としてください(**右図**)。

※使用量については裏面の**【外用薬の塗り方】**を参考にしてください。

※0.5%製剤を4週間使用しても症状が改善しない場合は，医師に相談してください。

● 成人では手のひら1枚分の塗布量が，おおむね体表面積の1%への塗布量になります。

この薬の使用中に気を付けること

- この薬を塗ったところに，赤または白の小さな吹き出物やニキビなどがあらわれることがあるので，気になる症状があらわれた場合には，医師または薬剤師に相談してください。
- 粘膜や皮膚の傷，ただれ部位などには塗らないでください。
- 万一，眼に入った場合は，直ちに水で洗い流してください。
- 皮膚感染症と診断された部位を避けて塗ってください。
- 妊婦または妊娠している可能性がある方は，医師に相談してください。
- 授乳している方は，医師に相談してください。また，授乳している方が使用する場合は，乳頭等の塗布部位を乳児が舐めないように注意してください。
- 他の医師に受診する場合や，薬局などで他の薬を購入する場合は，必ずこの薬を使用していることを，医師または薬剤師に伝えてください。

保管方法

- 直射日光と湿気を避けて，室温（1～30℃）で保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

参考 外用薬の塗り方

使用量の目安として，FTUという単位を用います。

FTU（フィンガーチップユニット）

- 大人の人差し指の先端から第1関節まで出した量を1FTUといいます。



- 1FTUで大人の手のひら2枚分くらいの面積に塗ることができます。



製造販売元
塩野義製薬株式会社
SHIONOGI
大阪市中央区道修町３丁目１番８号

販売元
鳥居薬品株式会社
SHIONOGI Group Company
東京都中央区日本橋本町3-4-1

®：登録商標
禁無断転載　©2025 SHIONOGI
COR-C-0002(V01)　審422040
CORTE001F
2025年12月作成