

アシテア®を服用される患者さんや保護者の方へ

本剤の調剤を受ける際には、薬剤師に本カードをご提示ください。本剤服用後30分間および治療開始初期は、次のような症状に特に注意してください。

▶症状があらわれた場合、直ちに医療機関を受診してください。◀

アナフィラキシーの前兆症状 (薬を服用して数分から30分以内にあらわれることが多い)

皮膚の症状 皮膚のかゆみ、じんま疹、紅斑・皮膚の発赤等

消化器の症状 胃痛、吐き気、嘔吐、下痢等

眼の症状 視覚の異常、視野が狭くなる等

呼吸器の症状 咳、声のかすれ、鼻がつまる、くしゃみ、のどのかゆみ、胸のしめつけ感、息苦しさ、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音)、チアノーゼ(皮膚や粘膜が青紫色になる)等

循環器の症状 脈が速くなる、不整脈、血圧が下がる等

その他の症状 不安、恐怖感、意識がぼんやりする等

厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「アナフィラキシー」平成20年3月(令和元年9月改訂)より

私はアレルギー免疫療法を行っています。

フリガナ		生年月日	大・昭・平		
氏名		年	月	日	生
医療機関 かかりつけ	医療機関名/連絡先:	電話()	-		
	医師名:				
	アシテア®受講修了医師番号				
	時間外連絡先:	電話()	-		

本カードは必ず携帯してください

RMP

シオノギ製薬

ACT-C-0005 (V03) 2021年11月作成