

排便時の痛み、のどの痛み 等

●**重度の皮膚障害**
皮膚の広い範囲が赤くなる、38℃以上の高熱、唇や陰部のただれ、排尿・

●**末梢神経障害(ギラン・バレー症候群を含む)**
手や足がピリピリとしびれる・ジンジンと痛む、手足の感覚がなくなる・鈍
くなる、手足に力が入らない、物がつかみづらい、歩行時につまずく、イス
から立ち上がれない、階段を昇れない 等

●**眼障害**
涙の増加、光をまぶし<感じる、見えにくい、眼の乾き、眼のかすみ、眼の
眼の充血、眼やまぶたのはれ、目やに、眼のかゆみ、眼の不快感や異物感、
ピリピリ・チクチクした痛み 等

下記の症状があらわれた際には、ただちに医療機関に連絡してください。

特に注意していただきたい副作用

RMP

テブダック 連絡カード

監修：横浜市立大学附属病院産婦人科 部長 宮城 悦子先生

テブダックによる治療を受けている患者さんとそのご家族へ

- このカードは、常に携帯してください。
- 他の医療機関を受診する際は、このカードを必ず提示し、テブダックの治療を受けていることをお伝えください。
- テブダックの治療により副作用があらわれることがあります。
裏面の「特に注意していただきたい副作用」の症状や、他に気になる症状が
ありましたら、すぐにテブダックの治療を行った医療機関に連絡してください。
- 適切な治療効果を得るため、医師の指示に従ってください。

眼のケアのために毎日守っていただきたいこと

- コンタクトレンズは使用しないでください。
- 毎日、複数回ドライアイ治療用点眼剤の点眼を行ってください。

テブツツの治療を行った医療機関の連絡先

医療機関名	担当医師の診療科	担当医師名	医療機関の電話番号

<すりについて不明な点がございましたら以下へご連絡ください。>

シエンマツ株式会社 <すり相談室

TEL:0120-470-317

(受付時間:9時~17時半 土日祝日、会社休業日を除く)

テブツツ患者さんHP



<https://www.tivdak.jp>

医療関係者の方へ

こちらの患者さんは、テブツツの治療を受けています

- テブツツ (製剤名: テブツツ®点滴静注用40mg) は、抗体薬物複合体と呼ばれる薬剤です。
- テブツツの副作用として、眼障害や末梢神経障害 (ギラン・バレー症候群を含む)、重度の皮膚障害があらわれることがあります。
- 緊急時は上記のテブツツの治療を行った医療機関に連絡してください。

詳細は電子添文をご参照ください。

専用アプリ「添文ナビ」®でGS-1バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等をご覧できます。



(01)049879660000038