

リトゴビ[®]を服用される方へ

リトゴビ錠の服用中に網膜剥離^{もうまくはくり}や高リン血症^{こうけっしょう}があらわれることがあります。これらの副作用には特に注意してください。

自分で
わかる
副作用

検査で
わかる
副作用

もうまくはくり
網膜剥離

発現
頻度

網膜剥離を含む網膜障害
約**10**人に**1**人

主な症状



以下のような症状がある時は、
すぐに担当の医師に連絡してください。

- 視力が下がる
- 近くのものにピントが合いにくい
- 色がわかりにくくなる
- 暗くなると見えにくくなる
- 視野が狭くなる
- 視野の中に見えない部分がある
- チカチカ・キラキラする光が見える
- ものがゆがんで見える
- ゴミのような浮遊物^{ふゆうぶつ}が見える

視野が狭くなる



チカチカ・キラキラする
光が見える



ものが
ゆがんで見える



ゴミのような
浮遊物が見える



注意事項と対策

- 定期的に眼科検査を行って異常がないか確認します。
- 医師の指示によって服用をお休みし、お薬の量を減らした上で再開する場合があります。
- 日頃から見えかたに変化がないか確認してください。
- 見えにくさや普段とちがうと感じる時は、我慢せずに担当の医師や看護師、薬剤師に連絡してください。

検査で
わかる
副作用

こう けっしょう
高リン血症

発現
頻度

約10人に9人



以下のような症状がある時は、
すぐに担当の医師に連絡してください。

高リン血症は多くの場合無症状ですが、
合併症により以下のような症状を引き起こすことがあります。

筋肉の痙攣^{けいれん}

はげしい皮膚のかゆみ^{ひぶ}

息ぐるしさ

関節や骨の痛み

はげしい頭の痛み

注意事項と対策

- 定期的に血液検査を行って異常がないか確認します。
- 日頃からインスタント食品やファストフード、清涼飲料水などの飲食をなるべく控えてください。
医師の指示のもと、食事からのリンの摂取を制限する場合があります。
- 不適切なリン制限は栄養障害の原因となることがあるので、
食事に関する詳細は担当の医師や管理栄養士などにご相談ください。
- 医師の指示によってお薬の量を減らしたり、服用をお休みする
場合があります。
- 食事制限に加え、高リン血症治療剤を用いる場合があります。
担当の医師の指示に従ってください。

医療機関名



大鵬薬品工業株式会社

36-0020-1
2023年7月作成