

エラヒアの治療を受けられる際の注意事項

眼に関する副作用があらわれることがあるので、以下のような症状がでた場合には、主治医に相談の上、眼科を受診してください。

症 状

- 霧がかかったような見えかた
- 目の痛み
- 目の異物感
- 涙が出る
- まぶしい
- 目の充血
- 視力の低下
- 目が乾く など

※国内臨床試験では、眼に関する副作用は初回投与後1.1～8.0週の間に発現したと報告されています。

日常生活での影響

- 読書やテレビを見るのに集中できない
- パソコン、携帯電話、タブレットなどの操作に支障が出る
- 太陽の光や室内のライトで目を開けにくい
- 車の運転がしにくい
- 新聞や本が読みづらい など

注意していただきたいこと

- 眼に関連する副作用は、できるだけ早く気づき、必要に応じてエラヒアの量を調整したり、一時的に薬をお休みすることが大切です。
- エラヒアの投与前、投与中に定期的に眼科で検査を受けてください。
- コンタクトレンズの装着は避けてください。
- 毎日、防腐剤の入っていない人工涙液(目薬)※を1日4回以上点眼してください。
※：眼科医に相談の上、調剤薬局・ドラッグストアで購入してください。
- 車の運転や機械の操作を行う際は十分ご注意ください。

眼に関する副作用以外に、間質性肺疾患、末梢神経障害、血小板減少症等があらわれることがあります。以下のような症状がでた場合には、ただちに医療機関に連絡してください。

間質性肺疾患

- 咳
- 息切れ
- 息苦しい
- 発熱

※国内臨床試験では、間質性肺疾患は初回投与後5.1～19.1週の間に発現したと報告されています。

末梢神経障害

- 手足のしびれ
- 手足の痛み
- 手足の感覚がなくなる
- 手足の力が入らない
- 物がつかみづらい
- 歩行時につまづく

※国内臨床試験では、末梢神経障害は初回投与後4.0～13.1週の間に発現したと報告されています。

血小板減少症

- 手足に点状出血
- あおあざがしやすい
- 出血しやすい

※国内臨床試験では、血小板減少症は初回投与後1.1～27.3週の間に発現したと報告されています。

※副作用の発現時期は個人差があるため、記載されている期間以外でも症状がでる可能性があります。

医療機関名・連絡先



製造販売元

武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

【文献請求先及び問い合わせ先】

武田薬品工業株式会社 <すり相談室>

フリーダイヤル 0120-566-587

受付時間 9:00～17:30 (土日祝日・弊社休業日を除く)

以下の症状でどれくらい困っていますか？

霧がかかったような見えかた	全く影響がない	0	1	2	3	4	5	普段の活動を行うことができない
目の痛み	全く影響がない	0	1	2	3	4	5	普段の活動を行うことができない
目の異物感	全く影響がない	0	1	2	3	4	5	普段の活動を行うことができない
涙が出る	全く影響がない	0	1	2	3	4	5	普段の活動を行うことができない
まぶしい	全く影響がない	0	1	2	3	4	5	普段の活動を行うことができない
目の充血	全く影響がない	0	1	2	3	4	5	普段の活動を行うことができない
視力の低下	全く影響がない	0	1	2	3	4	5	普段の活動を行うことができない
目が乾く	全く影響がない	0	1	2	3	4	5	普段の活動を行うことができない
その他（ ）	全く影響がない	0	1	2	3	4	5	普段の活動を行うことができない

☐ 2週間以上前 ☐ 1週間以上前 ☐ 1週間以内

- ☐ 読書やテレビを見るのに集中できない
- ☐ パソコン、携帯電話、タブレットなどの操作に支障が出る
- ☐ 太陽の光や室内のライトで目を開けにくい
- ☐ 車の運転がしにくい
- ☐ 新聞や本が読みづらい
- ☐ その他（ ）

2026年9月作成